

**Тестовый контроль  
по специальности «Педиатрия»  
все категории**

Выбрать один правильный ответ

1. Что включается в понятие "перинатальная смертность"?
- А. число детей, умерших до года, на 1000 родившихся живыми
  - Б. число детей, умерших на первой неделе жизни, от общего числа родившихся живыми и мертвыми
  - В. число мертворожденных

Выбрать один правильный ответ

2. Что включается в понятие «младенческая смертность»?
- А. число детей, умерших до года, на 1000 родившихся живыми
  - Б. число детей, умерших на первой неделе жизни, от общего числа родившихся живыми и мертвыми
  - В. число мертворожденных

Выбрать один правильный ответ

3. У ребенка 7 лет отсутствует рубчик после вакцинации БЦЖ. Ваша тактика.
- А. провести обязательную ревакцинацию
  - Б. провести ревакцинацию только в случае отрицательной реакции Манту
  - В. ребенок ревакцинации не подлежит
  - Г. провести ревакцинацию только в случае положительной реакции Манту
  - Д. ревакцинировать в случае сомнительной реакции Манту

Выбрать один правильный ответ

4. Какие заболевания являются противопоказанием для вакцинации живыми вакцинами ?
- А. муковисцидоз
  - Б. эпилепсия
  - В. атопический дерматит
  - Г. рахит
  - Д. иммунодефицитное состояние

Выбрать один правильный ответ

5. Поствакцинальная реакция на живую коревую вакцину в виде бледно-розовой сыпи появляется:
- А. на 1 сутки
  - Б. на 3 сутки
  - В. на 5-6 сутки
  - Г. на 7-8 сутки
  - Д. на 5-12 сутки

Выбрать несколько правильных ответов

6. Суточное количество пищи в первые 10 дней жизни ребенка рассчитывается:
- А. 70 или 80 мл х n (где n – число дней жизни)
  - Б. 2% от массы х n ( где n – число дней жизни)

- В. 1/5 массы тела
- Г. 1/6 массы тела
- Д. 1/7 массы тела

Выбрать один правильный ответ

7. Развитие синдрома Уотерхауса-Фридериксена (острой надпочечниковой недостаточности) характерно для тяжелого течения:

- А. стафилококкового менингита
- Б. пневмококкового менингита
- В. менингита, вызванного вирусом Коксаки
- Г. менингококкцемии
- Д. туберкулезного менингита

Выбрать один правильный ответ

8. Детям, находящимся на естественном вскармливании, введение прикорма рекомендуется в возрасте:

- А. 3 месяца
- Б. 4 месяца
- В. 5 месяцев
- Г. 4 - 6 месяцев
- Д. 6 - 7 месяцев

Выбрать один правильный ответ

9. У кормящей женщины час назад повысилась температура до 37,5 гр. С, появилось уплотнение молочной железы, болезненность при пальпации, небольшая гиперемия. При сцеживании молоко обычного цвета, без примесей слизи и крови. Ваши действия?

- А. запретить кормление грудным молоком из пораженной молочной железы
- Б. сцеживать молоко и кормить ребенка пастеризованным молоком
- В. продолжать кормить грудью с обязательным сцеживанием остатков молока после кормления
- Г. запретить кормление грудью, назначив бактериологическое исследование молока.
- Д. перевести на искусственное вскармливание

Выбрать один правильный ответ

10. У кормящей женщины в течение 2 суток держится температура до 39-40 гр. С, беспокоят боли в левой молочной железе. Левая молочная железа увеличена в объеме, слева в верхнем наружном квадрате яркая гиперемия кожи с синюшным оттенком. Пальпация крайне болезненна, определяется значительное уплотнение молочной железы. При попытке сцеживания из груди выделяется молоко с примесью гноя и крови. Ваша тактика?

- А. необходимо срочно обратиться к хирургу
- Б. сцедить молоко из этой груди и кормить сцеженным молоком
- В. продолжать кормить здоровой грудью, а молоко из груди с признаками воспаления сцеживать каждое кормление
- Г. сцедить молоко из этой груди и кормить сцеженным пастеризованным молоком.
- Д. перевести ребенка на искусственное вскармливание.

Выбрать несколько правильных ответов

11. К правилам «свободного вскармливания» ребенка первого месяца жизни, находящегося на исключительно грудном вскармливании, относится все нижеперечисленное, кроме:

- А. кормление ребенка в соответствии с его желанием
- Б. кормление в ночное время
- В. регулярное допаивание водой между кормлениями
- Г. кормление через каждые 3 часа
- Д. кормление, как только ребенок просыпается

Выбрать несколько правильных ответов

12. Какие признаки характерны для пилоростеноза?

- А. частые срыгивания
- Б. учащенный стул
- В. снижение массы тела
- Г. регулярная рвота фонтаном
- Д. запоры

Выбрать один правильный ответ

13. Значительное снижение уровня сахара в спинномозговой жидкости (до 0,1 г/л) характерно для менингита, вызванного:

- А. вирусами гриппа
- Б. пневмококком
- В. вирусом паротита
- Г. туберкулезной палочкой
- Д. вирусом Коксаки

Выбрать один правильный ответ

14. Ребенок 1 года 6 месяцев. Детское учреждение не посещает; анамнез благополучный; физическое и нервно-психическое развитие соответствует возрастной норме; 3 раза за последний год болел ОРЗ; уровень основных функций нормальный; при осмотре соматически здоров. К какой группе здоровья можно отнести ребенка?

- А. к первой
- Б. ко второй
- В. к третьей
- Г. к четвертой
- Д. к пятой

Выбрать один правильный ответ

15. При каком сочетании критериев Вы отнесете ребенка к III группе здоровья?

А. неблагополучный биологический анамнез; нормальное физическое развитие; нервно-психическое развитие с отклонениями (внимание и память); резистентность не удовлетворительная. Диагноз: хронический синусит, период ремиссии.

Б. благополучный биологический анамнез; физическое развитие – рост (3 коридор), масса тела (2 коридор); нервно-психическое развитие – 2 группа; 5 острых заболеваний за последний год; отклонения в поведении в виде укороченного сна и снижения аппетита; при осмотре видимых отклонений от

нормы не выявлено.

В. неблагополучный биологический анамнез; нормальное физическое развитие и нервно-психическое развитие; удовлетворительная резистентность; уровень основных функций соответствует возрастной норме; соматически здоров.

Выбрать один правильный ответ

16. У ребенка 8 месяцев, родившегося осенью и получившего с профилактической целью курс витамина Д<sub>3</sub>, при осмотре обнаружены деформации костей грудной клетки и черепа. Кальций крови 2,25 ммоль/л, фосфор - 1,71 ммоль/л. О каком периоде рахита можно думать?

- А. разгар
- Б. начальный
- В. остаточные явления
- Г. реконвалесценция

Выбрать один правильный ответ

17. Ребенку 2,5 месяца (родился в начале ноября), на грудном вскармливании. В последние 2-3 недели беспокоен, плохо спит, вздрагивает во сне, потлив. Сосет грудь менее охотно, чем прежде. Стул неустойчивый. При осмотре: бледен, кожа влажная, затылок облысевший. Тургор тканей понижен. Видимых деформаций скелета нет, края большого родничка податливы. Внутренние органы без патологических изменений. Диагностирован рахит. Какая стадия рахита наиболее вероятна в данном случае?

- А. начальный период
- Б. период разгара
- В. период реконвалесценции
- Г. период остаточных явлений

Выбрать один правильный ответ

18. У ребенка 6-ти месяцев с клиническими признаками рахита II степени тяжести при назначении лечебной дозы витамина Д нет улучшения. Что из нижеперечисленного может быть причиной этого?

- А. недостаточное пребывание на воздухе
- Б. нерациональное вскармливание
- В. плохие бытовые условия
- Г. сопутствующая ферментопатия

Выбрать один правильный ответ

19. Какую профилактическую суточную дозу витамина Д следует считать оптимальной для доношенных грудных детей?

- А. 400 МЕ
- Б. 500 МЕ
- В. 800 МЕ
- Г. 1000 МЕ
- Д. 1500 МЕ

Выбрать несколько правильных ответов

20. Какие клинические признаки можно отнести к симптомам рахита?

- А. наличие «четок» на ребрах

- Б. наличие Гarrisоновой борозды на грудной клетке
- В. мышечная гипотония
- Г. искривление трубчатых костей
- Д. укорочение конечностей

Выбрать один правильный ответ

21. Ведущую роль в структуре этиологических факторов инфекции мочевой системы у детей занимает

- А. кишечная палочка
- Б. протей
- В. синегнойная палочка
- Г. стафилококк

Выбрать несколько правильных ответов

22. Какие группы антибактериальных препаратов применяются для лечения ИМС у детей

- А. цефалоспорины
- Б. защищенные пенициллины
- В. нитрофураны
- Г. аминогликозиды
- Д. фторхинолоны

Выбрать один правильный ответ

23. Базисная терапия при гломерулонефрите с нефротическим синдромом

- А) глюкокортикостероиды, антиагреганты, антикоагулянты
- Б) НПВП, антиагреганты, антикоагулянты
- В) микофенолата мофетил, антиагреганты, антикоагулянты

Выбрать один правильный ответ

24. Для больного сахарным диабетом не характерно:

- А) жажда;
- Б) полиурия;
- В) экзофтальм;
- Г) расчесы на коже;
- Д) сухость кожи.

Выбрать один правильный ответ

25. При врожденном нелеченном первичном гипотиреозе не наблюдается:

- А) полиурия;
- Б) пастозность тканей;
- В) крупный язык;
- Г) сухость кожи;
- Д) грубый голос.

Выбрать один правильный ответ

26. У девочки 3-х лет полиурия, дефицит веса 10%, кожа и язык сухие, гиперемия щек, запах ацетона в выдыхаемом воздухе, печень +3 см. Гликемия натощак — 12,8 ммоль/л. В моче 6% сахара при суточном диурезе 2,5 литра.

Ваш предварительный диагноз:

- А) почечная глюкозурия;

- Б) инсулинозависимый сахарный диабет;
- В) несахарный диабет;
- Г) нарушение толерантности к углеводам;
- Д) тубулопатия.

Выбрать один правильный ответ

27. При хронической надпочечниковой недостаточности (болезнь Аддисона) наблюдается:

- А) тремор рук;
- Б) судороги;
- В) повышенный аппетит;
- Г) гиперпигментация кожи;
- Д) желтушность кожи.

Выбрать один правильный ответ

28. Для неонатального скрининга на врожденный гипотиреоз используют:

- А) определение уровня ТТГ,  $T_3$ ,  $T_4$  в плазме
- Б) определение уровня ТТГ, в плазме
- В) определение уровня ТТГ в сухом пятне крови
- Г) определение  $T_4$  в сухом пятне крови

Выбрать один правильный ответ

29. Нормальный тип глюкозотолерантного теста это:

- А) гликемия натощак  $> 5,6$  ммоль/л, но  $< 6,1$  ммоль/л; через 2 часа после нагрузки глюкозой гликемия  $< 7,8$  ммоль/л
- Б) гликемия натощак  $\leq 5,5$  ммоль/л, через 2 часа после нагрузки глюкозой  $< 7,8$  ммоль/л
- В) гликемия натощак  $> 6,1$  ммоль/л, через 2 часа после нагрузки глюкозой  $> 11,1$  ммоль/л

Выбрать несколько правильных ответов

30. Для первичной хронической надпочечниковой недостаточности характерно:

- А) гипогликемия, гипонатриемия, гипохлоремия, гиперкалиемия;
- Б) гипогликемия, гипернатриемия, гиперхлоремия, гипокалиемия;
- В) сниженный уровень кортизола в плазме и повышенный уровень АКТГ;
- Г) сниженный уровень кортизола в плазме и сниженный уровень АКТГ.

Выбрать несколько правильных ответов

31. При хронической надпочечниковой недостаточности в крови наблюдается:

- А) Снижение продукции глюкокортикостероидов
- Б) повышение продукции глюкокортикостероидов
- В) снижение продукции минералокортикоидов
- Г) повышение продукции минералокортикоидов
- Д) снижение продукции адреналина и норадреналина

Выбрать один правильный ответ

32. Для оказания неотложной помощи ребенку с сахарным диабетом, находящемуся в коме, если нет возможности определить гликемию, следует ввести:

- А. короткий инсулин в\венно струйно
- Б. бикарбонат натрия в виде клизмы
- В. 20% р-р глюкозы в\венно струйно
- Г. 5% р-р глюкозы в\венно капельно

Выбрать один правильный ответ

33. Задержка роста, обусловленная церебрально-гипофизарным нанизмом, наиболее часто диагностируется:

- А) при рождении;
- Б) на 1-м году жизни;
- В) в 2-4 года;
- Г) в пубертате

Выбрать один правильный ответ

34. О преждевременном половом созревании свидетельствует появление вторичных половых признаков у девочек моложе:

- А) 8 лет;
- Б) 9 лет;
- В) 11 лет;
- Г) 13 лет

Выбрать один правильный ответ

35. Диагноз несахарного диабета подтверждается следующими данными:

- А) снижение удельной плотности мочи  $< 1010$ ;
- Б) снижение удельной плотности мочи  $< 1005$ ;
- В) глюкозурия;
- Г) гипонатриемия

Выбрать один правильный ответ

36. Симптомы, не характерные для сольтертяющей формы врожденной дисфункции коры надпочечников:

- А) гермафродитное строение гениталий у девочек;
- Б) запоры;
- В) гиперпигментация крупных складок и ареол
- Г) жидкий стул;
- Д) упорная рвота фонтаном, не связанная с приемом пищи

Выбрать один правильный ответ

37. Показания для назначения антибиотиков при вирусном заболевании:

- А. отягощенный преморбидный фон
- Б. выраженная интоксикация
- В. фебрильная температура свыше 3-х дней
- Г. гнойные осложнения
- Д. все перечисленное

Выбрать несколько правильных ответов

38. Рекомендуемые для детей жаропонижающие средства с оптимальным профилем безопасности:

- А. нимесулид
- Б. аспирин
- В. парацетамол
- Г. ибупрофен
- Д. индометацин

Выбрать один правильный ответ

39. Препараты выбора для лечения стрептококковой ангины:

- А. оксациллин
- Б. макропен
- В. амоксициллин
- Г. пенициллин
- Д. линкомицин

Выбрать несколько правильных ответов

40. Что лежит в основе обструктивного синдрома?

- А. гиперсекреция
- Б. отек слизистой бронхиального дерева
- В. бронхоспазм
- Г. отек голосовых связок
- Д. снижение иммунологической реактивности

Выбрать один правильный ответ

41. Что определяет тяжесть бронхиолита?

- А. интоксикация
- Б. дыхательная недостаточность
- В. сердечная недостаточность

Выбрать один правильный ответ

42. Препарат выбора для неотложной помощи при обструктивном бронхите у детей раннего возраста:

- А. эуфиллин
- Б. но-шпа
- В. супрастин
- Г. беродуал

Выбрать один правильный ответ

43. В этиологии острой внебольничной пневмонии у детей с 6 месячного возраста наиболее значимым возбудителем является:

- А. пневмококк
- Б. гемофильная палочка
- В. стафилококк
- Г. кишечная палочка

Выбрать один правильный ответ

44. Госпитальная пневмония развивается:

- А. через 48 часов после поступления ребенка в стационар



- Б. через 24 часа после поступления ребенка в стационар
- В. через 72 часа после поступления ребенка в стационар

Выбрать один правильный ответ

45. Острая госпитальная пневмония у детей вызывается:

- А. синегнойной палочкой
- Б. ацинетобактером
- В. кишечной палочкой
- Г. клебсиеллой
- Д. все перечисленное

Выбрать несколько правильных ответов

46. Критериями диагностики неосложненной острой пневмонии могут быть:

- А. боли в животе
- Б. локальное притупление перкуторного звука
- В. боли в груди
- Г. кашель
- Д. локальные крепитирующие хрипы в легких

Выбрать несколько правильных ответов

47. Характерные изменения в общем анализе крови при пневмонии:

- А. лейкоцитоз
- Б. нейтрофильный сдвиг влево
- В. тромбоцитопения
- Г. увеличение СОЭ

Выбрать несколько правильных ответов

48. Препаратами выбора для лечения внебольничных пневмоний у детей старше 6 месяцев являются:

- А. амоксициллин
- Б. пенициллин
- В. амоксициллина клавуланат
- Г. цефиксим

Выбрать один правильный ответ

49. Критериями диагностики аллергического заболевания являются все, кроме:

- А. зуд кожи
- Б. Наличие у ближайших родственников бронхиальной астмы или поллиноза
- В. Распространенная сухость кожи
- Г. Начало дерматита до 2-х летнего возраста
- Д. Дисбиоз кишечника

Выбрать один правильный ответ

50. При аллергических процессах чаще всего изменяется уровень иммуноглобулинов:

- А. А
- Б. G
- В. М

Г. Е

Выбрать один правильный ответ

51. Соотношение частоты надавливаний (компрессий) сердца и ИВЛ при проведении сердечно-легочной реанимации:

- А. 2 – 3 : 1
- Б. 3 – 4 : 1
- В. 4 – 5 : 1
- Г. 5 – 6 : 1

Выбрать один правильный ответ

52. К положительным критериям сердечной реанимации не относятся:

- А. уменьшение степени цианоза кожи и слизистых
- Б. расширение зрачков
- В. возобновление самостоятельных вдохов и сердечных сокращений
- Г. повышение АД до 50 – 70 мм рт.ст.

Выбрать один правильный ответ

53. Ребенку 3 мес. Диагноз: БЛД тяжелой степени. Выберите необходимый метод доставки будесонида суспензии:

- А. ультразвуковой небулайзер
- Б. компрессорный небулайзер
- В. аэроочамбер
- Г. турбухалер

Выбрать один правильный ответ

54. Ребенок, 5 мес., заболел остро с появления приступообразного сухого кашля, одышки смешанного характера, насморка. Температура не повышалась. При осмотре ребенок вялый, отказывается от еды. Кожные покровы бледные, параорбитальный и периоральный цианоз. В зеве яркая гиперемия. В легких – крепитирующие хрипы по всем полям. Перкуторно-коробочный звук. Ваш предположительный диагноз:

- А. острый бронхит
- Б. пневмония
- В. обструктивный бронхит
- Г. бронхиолит

Выбрать один правильный ответ

55. Искусственное вскармливание ребенка первого года жизни с атопическим дерматитом целесообразно проводить:

- А. Адаптированными молочными смесями на основе коровьего молока
- Б. Соевыми смесями
- В. Смесями на основе частично гидролизованного белка
- Г. Кисло – молочными смесями

Выбрать один правильный ответ

56. У мальчика 5 лет утомляемость, усиление пульсации левого желудочка, дрожание во 2-м межреберье слева, на ЭКГ перегрузка левого желудочка, на рентгенограмме гиперволемия малого круга, увеличение левого желудочка. Ваш предварительный диагноз

- А) Стеноз легочной артерии
- Б) Дефект межжелудочковой перегородки
- В) Субаортальный стеноз
- Г) Открытый артериальный проток

Выбрать один правильный ответ

57. При бактериальном поражении открытого артериального протока наблюдается

- А) увеличение селезенки
- Б) лихорадка
- В) увеличение СОЭ
- Г) анемия
- Д) все перечисленное

Выбрать один правильный ответ

58. При одышечно-цианотическом приступе у ребенка с тетрадой Фалло нецелесообразно

- А) ввести строфантин
- Б) дать кислород
- В) назначить анаприлин (обзидан)
- Г) назначить промедол

Выбрать один правильный ответ

59. Ребенку с предварительным диагнозом «ревматизм» необходимо назначить

- А) клинический анализ крови амбулаторно
- Б) биохимический анализ крови амбулаторно
- В) консультацию кардиоревматолога
- Г) госпитализацию

Выбрать один правильный ответ

60. Узурь ребер характерны

- А) для вазоренальной гипертензии
- Б) для узелкового периартериита
- В) для открытого артериального протока
- Г) для коарктации аорты

Выбрать один правильный ответ

61. Для суправентрикулярной формы пароксизмальной тахикардии характерными ЭКГ-признаками являются

- А) ритм 130 в минуту, регулярный, суправентрикулярный (узкий) комплекс QRS
- Б) ритм 160 в минуту, регулярный, резко деформированный комплекс QRS
- В) ритм 150 в минуту, нерегулярный, узкий комплекс QRS
- Г) ритм более 180 в минуту, регулярный, суправентрикулярный комплекс QRS

Выбрать один правильный ответ

62. Препаратом, с которого целесообразно начать выведение из приступа пароксизмальной тахикардии ребенка в возрасте 8 месяцев (ЭКГ не записывалась, артериальное давление измерить не удалось) является

- А) АТФ внутривенно струйно
- Б) дигоксин внутрь
- В) новокаинамид внутривенно

Г) индерал внутрь

Выбрать один правильный ответ

63. При поствирусном миокардите наиболее часто отмечается

- А) систолодиастолический шум
- Б) длинный дующий систолический шум на верхушке
- В) мезодиастолический шум
- Г) глухие тоны, мягкий, короткий систолический шум

Выбрать один правильный ответ

64. Систолический шум с максимумом на верхушке сердца чаще всего связан с патологией

- А) аортального клапана
- Б) митрального клапана
- В) трехстворчатого клапана
- Г) легочной артерии

Выбрать один правильный ответ

65. Форма сердца на рентгенограмме в виде «деревянного башмачка» характерна

- А) для перикардита
- Б) аномального тотального дренажа легочных вен в верхнюю полую вену
- В) для тетрады Фалло
- Г) для коарктации аорты

Выбрать один правильный ответ

66. Акцент 2 тона на легочной артерии определяется

- А) при транспозиции аорты
- Б) при аномальных коронарных сосудах
- В) при легочной гипертензии
- Г) значения не имеет

Выбрать один правильный ответ

67. Диспансерное наблюдение у кардиоревматолога не требуется детям

- А) с неполной блокадой правой ножки пучка Гиса
- Б) с синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта
- Г) с неполной атриовентрикулярной блокадой

Выбрать один правильный ответ

68. У мальчика пяти лет носовые кровотечения, множественные кровоизлияния в виде экхимозов, гемартроз коленного сустава. НВ - 102 г/л, эритроциты -  $3,1 \times 10^{12}/л$ , тромбоциты -  $197 \times 10^9/л$ , удлинено время кровотечения. Время свертывания не нарушено. Ретракция кровяного сгустка IV степени. Какой диагноз наиболее вероятен?

- А. Геморрагический васкулит
- Б. Тромбоцитопеническая пурпура
- В. Болезнь Виллебранда
- Г. Гемофилия

Выбрать один правильный ответ

69. У ребенка с множественными кровоизлияниями различной величины и степени давности заподозрена тромбоцитопеническая пурпура. Какие из перечисленных ниже показателей могут подтвердить этот диагноз?

- А. Лейкоцитоз
- Б. Удлиненное время кровотечения
- В. Эозинофилия
- Г. Тромбоцитопения

Выбрать один правильный ответ

70. Для лечения железодефицитной анемии необходимо назначить:

- А. Препараты железа.
- Б. Рациональное питание, богатое железом и животным белком.
- В. Аскорбиновую кислоту.
- Г. Витамин В12.
- Д. Десферал.

Выбрать один правильный ответ

71. Данные скринингового исследования физического развития: длина - 50-й центиль; масса - 75-й центиль. Оцените физическое развитие

- а) нормальное
- б) отклонение в физическом развитии
- в) избыток массы

Выбрать один правильный ответ

72. К какой патологии чаще всего приводит влияние различных вредностей в первые 2 месяца беременности?

- а) к развитию дистрофических и некротических процессов
- б) к развитию воспалительных процессов
- в) к формированию пороков развития
- г) к патологии иммунной системы

Выбрать один правильный ответ

73. Какой фактор в большей степени определяет клиническую картину при внутриутробных инфекциях?

- а) сроки внутриутробного поражения
- б) токсичность возбудителя
- в) путь проникновения инфекции
- г) состояния реактивности организма плода

Выбрать один правильный ответ

74. С чем связано падение гемоглобина на 1-м месяце жизни у здорового доношенного новорожденного ребенка?

- а) с естественным гемолизом эритроцитов
- б) с торможением функции костного мозга
- в) с активацией ретикуло-гистиоцитарной системы
- г) со всеми перечисленными факторами

Выбрать один правильный ответ

75. Какое осложнение является самым тяжелым при желтушной форме

гемолитической болезни новорожденных?

- а) анемия
- б) поражение печени
- в) поражение ЦНС
- г) сердечная недостаточность

Выбрать один правильный ответ

76. Какие осложнения чаще вызывает энтеровирусная инфекция?

- а) серозный менингит и миокардит
- б) пневмонию
- в) отит-антрит
- г) пиелонефрит

Выбрать один правильный ответ

77. Причиной срыгивания у грудных детей является

- а) тупой угол перехода пищевода в желудок
- б) высокий тонус желудка в пилорическом отделе
- в) высокое внутрибрюшное давление
- г) все перечисленное

Выбрать один правильный ответ

78. Осложнения со стороны респираторного тракта могут быть вызваны наличием

- а) гастроэзофагеального рефлюкса III-IV степени
- б) диафрагмальной грыжей
- в) язвенной болезнью
- г) гастритом

Выбрать один правильный ответ

79. Развитие синдрома пилороспазма наиболее закономерно у ребенка

- а) с отягощенным акушерским анамнезом
- б) с отягощенной наследственностью
- в) при позднем прикладывании к груди
- г) при раннем "искусственном" вскармливании

Выбрать один правильный ответ

80. При подозрении на язвенную болезнь 12-перстной кишки не следует производить

- а) исследование кала на скрытую кровь
- б) гастродуоденоскопию
- в) дуоденальное зондирование
- д) рентгеноконтрастное исследование

Выбрать один правильный ответ

81. Для синдрома желтухи при хроническом гепатите не характерен признак

- а) повышения непрямого билирубина
- б) повышения прямого билирубина

- в) гемолиза
- г) обесцвеченного кала

Выбрать один правильный ответ

82. Какой лабораторный признак характерен для желтухи Жильбера?

- а) непрямая гипербилирубинемия
- б) ретикулоцитоз
- в) повышение трансаминааз
- г) прямая гипербилирубинемия

Выбрать один правильный ответ

83. Размер головы доношенного новорожденного в норме колеблется:

- А. от 32 до 35 см
- Б. от 35 до 38 см
- В. от 34 до 36 см
- Г. от 36 до 39 см
- Д. более 38 см

Выбрать один правильный ответ

84. Рефлексы орального автоматизма в норме (кроме сосательного) угасают к:

- А. 1 месяцу жизни
- Б. 2 месяцу жизни
- В. 3 месяцу жизни
- Г. 4 месяцу жизни
- Д. 5-6 месяцу жизни

Выбрать один правильный ответ

85. При серозных вирусных менингитах плеоцитоз в ликворе обычно:

- А. нейтрофильно- лимфоцитарный
- Б. нейтрофильный
- В. в первые 2-3 дня лимфоцитарный, далее смешанный
- Г. всегда лимфоцитарный
- Д. в первые 2 дня может быть смешанным, далее лимфоцитарный

Выбрать один правильный ответ

86. Причиной инсульта у детей не может являться:

- А. аномалия развития сосудов головного мозга
- Б. стойкая артериальная гипертензия
- В. ревматизм
- Г. аневризмы сосудов головного мозга

Выбрать один правильный ответ

87. При субарахноидальном кровоизлиянии отмечается:

- А. менингеальный синдром, геморрагический ликвор
- Б. всегда высокая температура
- В. всегда центральный гемипарез
- Г. всегда парез глазодвигательных нервов

д. всегда нарушение координации

Выбрать несколько правильных ответов

88. Детский церебральный паралич в первые месяцы жизни может быть заподозрен на основании

- А. факторов риска по течению беременности и родам
- Б. патологической поструральной активности
- В. четкой задержки в двигательном и психическом развитии
- Г. нарушений мышечного тонуса
- Д. всего перечисленного

Выбрать один правильный ответ

89. Акушерский парез типа Дюшенна-Эрба характеризуется:

- А. периферическим парезом ног
- Б. центральным монопарезом руки
- В. периферическим парезом проксимального отдела руки
- Г. периферическим парезом дистального отдела руки
- Д. центральным парезом ног

Выбрать один правильный ответ

90. Для мигрени не характерно:

- А. случаи мигрени у других членов семьи
- Б. двухсторонняя локализация головной боли
- В. пульсирующая головная боль
- Г. периодичность возникновения
- Д. фото- и фонофобия

Выбрать один правильный ответ

91. Медицинская помощь при развитии обморока включает:

- А. анальгин
- Б. кофеин
- В. реланиум
- Г. настойку пустырника
- Д. прозерин



Выбрать один правильный ответ

92. При какой форме гломерулонефрита показано применение преднизолона с первых дней болезни?

- А. при нефротической
- Б. при гематурической
- В. при смешанной
- Г. при всех формах

Выбрать один правильный ответ

93. Какой из признаков не характерен для гиперкалиемии?

- А. глухость тонов сердца
- Б. брадикардия
- В. парестезия
- Г. тахикардия

Выбрать один правильный ответ

94. Для диагностики инфекции мочевой системы меньшее значение имеет

- А. общий анализ мочи
- Б. анализ мочи на бактериурию
- В. количественный анализ мочи
- Г. определение мочевины в крови

Выбрать один правильный ответ

95. Частое мочеиспускание является симптомом, характерным:

- А. для хронической почечной недостаточности
- Б. для воспаления мочевыводящих путей
- В. для гломерулонефрита
- Г. для всех перечисленных заболеваний

Выбрать один правильный ответ

96. У ребенка 9 лет вчера появилась головная боль, повторная рвота. Мочится мало. Сегодня появилось нарушение зрения. Ваши неотложные мероприятия

- А. срочная консультация окулиста
- Б. измерение артериального давления
- В. срочная консультация уролога
- Г. клинический анализ крови

Выбрать один правильный ответ

97. При дифференциальном диагнозе между перитонзиллитом и токсической формой дифтерии в пользу дифтерии свидетельствуют:

- А. лихорадка
- Б. резкая боль при глотании, тризм
- В. «выбухание» миндалины небной дужки с одной стороны
- Г. отек ротоглотки и шейной клетчатки, фибринозные налеты на миндалинах и за их пределами

Выбрать один правильный ответ

98. Какого типа сыпь наиболее характерна для менингококкцемии?

- А. розеолезная
- Б. пустулезная
- В. геморрагическая
- Г. герпетическая

Выбрать один правильный ответ

99. Характерными симптомами эпидемического паротита являются все следующие, кроме:

- А. лихорадки
- Б. увеличения околоушных слюнных желез
- В. увеличения подчелюстных слюнных желез
- Г. боли в животе
- Д. ангины

Выбрать несколько правильных ответов

100. Симптомами, типичными для катарального периода кори, являются все следующие, кроме:

- А. лихорадки
- Б. насморка
- В. глухого кашля
- Г. судороги
- Д. конъюнктивита

Выбрать один правильный ответ

101. Кто имеет право подписывать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от медицинского вмешательства?

- А) гражданин, нуждающийся в медицинской помощи;
- Б) один из родителей;
- В) законный представитель гражданина;
- Г) все вышеперечисленные.

Выбрать один правильный ответ

102. Какие виды экспертиз проводятся в соответствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ» от 21.11.2011г. №323-ФЗ?

- А) экспертиза временной нетрудоспособности;
- Б) экспертиза качества медицинской помощи;
- В) военно-врачебная экспертиза;
- Г) медико-социальная экспертиза;
- Д) экспертиза профессиональной пригодности;
- Е) экспертиза связи заболевания с профессией;
- Ж) судебно-медицинская;
- З) судебно-психиатрическая экспертиза;
- И) все вышеперечисленные.

Выбрать один правильный ответ

103. На какой срок может выдать листок нетрудоспособности врач единолично?

- А). на срок не более 15 дней;
- Б) на срок не более 30 дней;
- В) на весь срок нетрудоспособности.

Выбрать один правильный ответ

104. Какие формы контроля качества и безопасности медицинской деятельности определены в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ?»

- А) государственный контроль;
- Б) ведомственный контроль;
- В) внутренний контроль;
- Г) все вышеперечисленные.

Выбрать один правильный ответ

105. Как часто может гражданин выбирать медицинскую организацию для получения первичной медико-санитарной помощи, в том числе по территориально-участковому принципу?

- А) не чаще чем два раза в год;
- Б) не чаще чем один раз в год;
- В) не чаще одного раза в 2 года.

Выбрать один правильный ответ

106. Кто имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документацией пациента, отражающей состояние его здоровья?

- А) пациент и его законный представитель;
- Б) родственники;
- В) работодатели.

Выбрать один правильный ответ

107. Каким Приказом в настоящее время утвержден порядок выдачи листков нетрудоспособности?

- А) приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011г. №624н «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности»;
- Б) приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.08.2007г. №514 «О порядке выдачи медицинскими организациями листков нетрудоспособности»;
- В) приказом ФСС РФ №18, Минздрава РФ №29 от 29.01.2004г. «Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения».

Выбрать один правильный ответ

108. Каким Приказом в настоящее время утверждена форма бланка листка нетрудоспособности?

- А) приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011г. №624н «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности»;
- Б) приказом Минздравсоцразвития от 26.04.2011г. №347н «Об утверждении формы бланка листка нетрудоспособности»;
- В) приказом ФСС РФ №18, Минздрава РФ №29 от 29.01.2004г. «Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения».

Выбрать один правильный ответ

109. Каким приказом утверждена Инструкция о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения?

- А) приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011г. №624н «Об утверждении

порядка выдачи листков нетрудоспособности»;

Б) приказом Минздравсоцразвития от 26.04.2011г. №347н «Об утверждении формы бланка листка нетрудоспособности»;

В) приказом ФСС РФ №18, Минздрава РФ №29 от 29.01.2004г. «Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения».

Выбрать один правильный ответ

110. Укажите основные принципы охраны здоровья граждан в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

А) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий;

Б) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи;

В) приоритет охраны здоровья детей;

Г) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;

Д) ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья;

Е) доступность и качество медицинской помощи;

Ж) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи;

З) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;

И) соблюдение врачебной тайны;

К) всё вышеперечисленное.

Выбрать несколько правильных ответов

111. Ранние клинические признаки ВИЧ у детей:

А) гепатоспленомегалия;

Б) лимфаденопатия;

В) оральный кандидоз;

Г) миокардит;

Д) все вышеперечисленное верно.

Выбрать один правильный ответ

112. Замена противоретровирусного препарата или их комбинации рекомендуется в следующих ситуациях:

А) появление ранее отсутствующих или находившихся в ремиссии вторичных заболеваний не ранее, чем через 6 недель после начала лечения;

Б) появление ранее отсутствующих или находившихся в ремиссии вторичных заболеваний не ранее, чем через 12 недель после начала лечения.

Выбрать несколько правильных ответов

113. Наиболее частыми признаками ВИЧ-инфекции у детей являются:

А) персистирующая генерализованная лимфаденопатия;

Б) лимфома мозга;

В) кардиомиопатия;

Г) гепатоспленомегалия;

Д) все вышеперечисленное верно.

Выбрать один правильный ответ

114. Кандидоз у больных ВИЧ-инфекцией детей чаще протекает:

- А) с поражением верхних и нижних дыхательных путей;
- Б) с поражением желудочно-кишечного тракта;
- В) с поражением мочеполового тракта.

Выбрать один правильный ответ

115. Основными проявлениями рецидивирующих бактериальных инфекций у ВИЧ-инфицированных детей является патология:

- А) легочной системы;
- Б) мочевыделительной системы;
- В) нервной системы;
- Г) все вышеперечисленное верно.

Выбрать один правильный ответ

116. Выберите перечень кодов которые используются в настоящее время:

- А) 102,104,103,108,109,113,112,115,118,121,123,127,300,125.
- Б) 100,102,104,108,109,112,113,117,115,118,121,123,124,127,200.
- В) 102,104,103,108,109,112,113,115,118,120,200.

Выбрать несколько правильных ответов

117. Дотестовое консультирование по ВИЧ-инфекции характеризуется следующим:

- А) Предусматривает письменно фиксировать в медицинских документах факт информированного согласия;
- Б) Врачом любой специальности;
- В) Врачом имеющим специальное обучение по ВИЧ-инфекции;
- Г) Имеет цель-получить информированное согласие пациента для обследования;
- Д) Имеет цель-предоставить пациенту знания о ВИЧ-инфекции.
- Е) Цель консультирования-выявить патологию.

Выбрать один правильный ответ

118. Выберите уровень обсеменения в 1 куб.мл вирионами биологической жидкости, который позволяет заразиться при контакте с ВИЧ-инфицированным:

- А) От 5 до 10 вирионов;
- Б) Менее 5 вирионов;
- В) От 10 до 50 вирионов и более;
- Г) Более 300 вирионов.

Выбрать несколько правильных ответов

119. Каковы основные цели существующей в настоящее время антиретровирусной терапии ВИЧ-инфекции:

- А) Максимальное подавление репликации ВИЧ;

- Б) Полная элиминация вируса из организма;
- В) Сохранение функций иммунной системы;
- Г) Повышение качества жизни.

Выбрать несколько правильных ответов

120. Назовите отличия в обслуживании заведомо ВИЧ-инфицированного пациента при проведении парентеральной процедуры:

- А) Одеть маску, халат, перчатки, очки;
  - Б) Одеть двойные латексные перчатки;
  - В) Одеть бахилы, сменную обувь;
  - Г) Приготовить емкости с дез. раствором;
  - Д) Обработать руки для проведения хирургических вмешательств;
  - Е) Обработать ногтевые фаланги спиртовым раствором йода;
  - Ж) Выполнять процедуру в присутствии старшей медсестры или зав. отделением;
- З) Иметь дублера на случай аварийной ситуации.

Выбрать один правильный ответ

121. ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВОЗ К ОСНОВНЫМ НИЗ ОТНОСЯТ:

- А. Болезни системы кровообращения, рак, хронические заболевания легких, сахарный диабет, психические заболевания и расстройства.
- Б. Болезни системы кровообращения, рак, хронические заболевания легких, травмы, психические заболевания и расстройства
- В. Болезни системы кровообращения, рак, сахарный диабет, психические заболевания и расстройства.

Выбрать один правильный ответ

122. КАКИЕ ИЗ УПРАВЛЯЕМЫХ ФАКТОРОВ РИСКА СЧИТАЮТСЯ ОСНОВНЫМИ, ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЗА РОСТ СМЕРТНОСТИ В РОССИИ?

- А. курение, потребление алкоголя, нездоровое питание
- Б. только курение
- В. курение и повышенное артериальное давление
- Г. курение, повышенное артериальное давление, потребление алкоголя, нездоровое питание.

Выбрать несколько правильных ответов

122. КАКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА ОТНОСЯТСЯ К БИОЛОГИЧЕСКИМ МОДИФИЦИРУЕМЫМ?

- А. пол
- Б. возраст
- В. наследственность
- Г. гиперлипидемия
- Д. гипертензия
- Е. избыточная масса тела

Выбрать один правильный ответ

123. ОБУЧЕНИЕ ПО ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ РЕБЕНКА ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИ КРАТКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ

ВКЛЮЧАЕТ:

- А. Консультирование по питанию
- Б. Консультирование по проблемам алкоголя
- В. Консультирование по курению
- Г. Консультирование по оптимальной физической активности
- Д. Все перечисленное.

Выбрать один правильный ответ

124. КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНА ?

- А. запах изо рта;
  - Б. плохие зубы;
  - В. кашель;
  - Г. одышка;
  - Д. снижение спортивных показателей;
  - Е. частые респираторные инфекции;
  - Ж. зависимость от табака.
3. Все перечисленное.

Выбрать один правильный ответ

125. СООТНОШЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В НОРМЕ, КОГДА:

- А. АД на руках и ногах одинаково
- Б. АД на руках выше, чем на ногах
- В. АД на ногах выше, чем на руках на 20-30 мм рт ст

Выбрать несколько правильных ответов

126. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ОСНОВНЫЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА:

- А. курение
- Б. низкая физическая активность
- В. наследственность
- Г. гиперлипидемия
- Д. гипертензия
- Е. избыточная масса тела

Выбрать один правильный ответ

127. КРИТЕРИЙ РЕГУЛЯРНОГО КУРЕНИЯ У ПОДРОСТКА 16 ЛЕТ?

- А. выкуривает 1 сигарету 1 раз в неделю.
- Б. выкуривает 1 сигарету 1 раз в день
- В. выкуривает 3 сигареты за неделю
- Г. выкуривает 5 сигарет за неделю

Выбрать один правильный ответ

128. ИЗБЫТОЧНАЯ МАССА ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕ ОТНОСЯТСЯ К

- А. биологическим модифицируемым факторам риска
- Б. биологическим немодифицируемым факторам риска
- В. наследственно обусловленным факторам риска
- Г. поведенческим модифицируемым факторам риска

Выбрать один правильный ответ

129. У ДЕТЕЙ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ, ЕСЛИ УРОВЕНЬ АД РАВЕН ИЛИ ПРЕВЫШАЕТ КРИВОЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АД ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА, ПОЛА И РОСТА

А. 75 перцентиль

Б. 90 перцентиль

В. 95 перцентиль

Выбрать один правильный ответ

130. НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ 7-12 ЛЕТ

А. Коарктация аорты

Б. Паренхиматозные заболевания почек

В. Эссенциальная АГ

Выбрать один правильный ответ

131. ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ I СТЕПЕНИ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДОЛЖНО ПРОВОДИТСЯ НЕ МЕНЕЕ

А. 1 месяца

Б. 3 месяцев

В. 6 месяцев

Выбрать один правильный ответ

132. ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИАГНОЗА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ:

А. достаточно однократной регистрации повышенного АД

Б. необходимо, чтобы АД было выше нормы не менее, чем при двух посещениях в разные дни

В. обязательна регистрация повышенного АД (более 95 перцентилья) не менее, чем при трех посещениях с интервалом в 10-14 дней

Выбрать один правильный ответ

133. ХОДЬБА БЫСТРЫМ ШАГОМ СО СКОРОСТЬЮ >6 КМ/ЧАС ОТНОСИТСЯ ПО ИНТЕНСИВНОСТИ НАГРУЗКИ К:

А. легкой

Б. умеренной

В. интенсивной

Выбрать один правильный ответ

134. НАЗОВИТЕ ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ «ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ»:

А. нерациональное питание

Б. курение

В. малоподвижный образ жизни

Г. злоупотребление алкоголем

Д. злоупотребление поваренной солью

Е. Недостаточное употребление овощей и фруктов

Ж. все перечисленное

Выбрать один правильный ответ

135. КРИТЕРИЙ НИКОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ У МАЛЬЧИКА 12



ЛЕТ?

А.Посещает уроки физкультуры в школе 3 раза в неделю, по 60-90 минут проводит ежедневно в подвижных играх на улице со сверстниками

Б.Посещает уроки физкультуры в школе 3 раза в неделю, в спортивных и оздоровительных секциях не занимается, преодолевает дорогу из дома до школы пешком за 10 минут, редко проводит время на свежем воздухе, занимаясь подвижными играми

В. Посещает уроки физкультуры в школе 3 раза в неделю, 3 раза в неделю по 60 минут занимается аэробным фитнесом.