

Тестовый контроль по специальности «Рефлексотерапия» все категории.

1. Какая акупунктурная точка располагается на лучевом крае лучевой кости, в углублении выше шиловидного отростка, на 1,5 цуня проксимальнее лучезапястного сустава?

- а) 11 чжун-фу
- б) 5I чи-цзэ
- в) 7I ле-цюе
- г) 8I цзин-цюй

2. Какая акупунктурная точка располагается в подключичной ямке, на 6 цуней кнаружи от передней срединной линии, на уровне I межреберья?

- а) 11 чжун-фу
- б) 5I чи-цзэ
- в) 7I ле-цюе
- г) 8I цзин-цюй

3. Какая акупунктурная точка располагается во впадине между акромиальным отростком лопатки и большим бугром плечевой кости?

- а) 10II шоу-сань-ли
- б) 11II цюй-чи
- в) 15II цзянь-юй
- г) 16II цзюй-гу

4. Какая акупунктурная точка располагается в носогубной складке, на 0,5 цуня кнаружи от центра крыла носа?

- а) 20II ин-сян
- б) 1III чэн-ци
- в) 2III сы-бай
- г) 3III цзюй-ляо

5. Какая акупунктурная точка располагается под зрачком на середине нижнего края орбиты?

- а) 20П ин-сян
- б) 1П чэн-ци
- в) 2П сы-бай
- г) 3П цзюй-ляо

6. Какая акупунктурная точка располагается на тыле стопы, во впадине между сухожилиями длинного разгибателя большого пальца и длинного разгибателя пальцев?

- а) 36П цзу-сань-ли
- б) 40П фэн-лун
- в) 41П цзе-си
- г) 42П чун-ян

7. Какая акупунктурная точка располагается во впадине, на конце поперечной кожной складке лучезапястного сустава, у лучевого края лучевой артерии?

- а) 5I чи-цзэ
- б) 7I ле-цюе
- в) 8I цзин-цюй
- г) 9I тай-юань

8. Какая акупунктурная точка располагается у середины I пястной кости, на границе тыльной и ладонной поверхности кожи?

- а) 8I цзин-цюй
- б) 9I тай-юань
- в) 10I юй-цзи
- г) 11I шао-шан

9. Какая акупунктурная точка располагается на уровне шиловидного отростка лучевой кости, на 1 цунь выше точки 9I?

- а) 5I чи-цзэ
- б) 7I ле-цюе
- в) 8I цзин-цюй
- г) 10I юй-цзи

10. Какая акупунктурная точка располагается на лучевом крае запястья, между сухожилиями короткого и длинного разгибателей большого пальца?

- а) 3II сань-цзянь
- б) 4II хэ-гу
- в) 5II ян-си
- г) 6II пянь-ли

11. Какая акупунктурная точка располагается на дистальной фаланге II пальца кисти, примерно на 3 мм в лучевую сторону от корня ногтя?

- а) 11I шао-шан
- б) 1II шан-ян
- в) 9IX чжун-чун
- г) 9V шао-чун

12. Какая акупунктурная точка располагается во впадине кпереди от II и III плюснефаланговых суставов?

- а) 42III чун-ян
- б) 43III сянь-гу
- в) 44III нэй-тин
- г) 45III ли-дуй

13. Какая акупунктурная точка располагается на тыле кисти, в углу, образованном проксимальными концами I и II пястных костей?

- а) 4II хэ-гу
- б) 6II пянь-ли
- в) 1III цюй-чи
- г) 20II ин-сян

14. Какая акупунктурная точка располагается кнаружи от угла рта на 1 см?

- а) 20II ин-сян
- б) 4III ди-цан
- в) 1III чэн-ци
- г) 2III сы-бай

15. Какая акупунктурная точка располагается в сторону от пупка на 2 цуня?

- а) 25III тянь-шу
- б) 14IV фу-цзе
- в) 16IV фу-ай
- г) 35III ду-би

16. Какая акупунктурная точка располагается ниже верхнего края латерального мышцелка большеберцовой кости на 3 цуня, у наружного края передней большеберцовой мышцы?

- а) 36III цзу-сань-ли
- б) 40III фэн-лун
- в) 41III цзе-си
- г) 42III чун-ян

17. Какая акупунктурная точка располагается выше центра латеральной лодыжки на 8 цуней, у наружного края брюшка передней большеберцовой мышцы, на уровне точки 38III тяо-коу, кзади от нее на 1 цунь?

- а) 36III цзу-сань-ли
- б) 40III фэн-лун
- в) 41III цзе-си
- г) 42III чун-ян

18. Какая акупунктурная точка располагается на тыле стопы, между суставами II-III клиновидных и II-III плюсневых костей, на самой возвышенной части стопы?

- а) 42III чун-ян
- б) 43III сянь-гу
- в) 44III нэй-тин
- г) 45III ли-дуй

19. Какая акупунктурная точка располагается в межкостной щели между II и III плюсневыми костями, кзади от плюснефалангового сустава?

- а) 42III чун-ян
- б) 43III сянь-гу
- в) 44III нэй-тин
- г) 45III ли-дуй

20. Какая акупунктурная точка располагается на 3 мм от наружного края корня ногтя II пальца стопы?

- а) 42III чун-ян
- б) 43III сянь-гу
- в) 44III нэй-тин
- г) 45III ли-дуй

21. Какая акупунктурная точка располагается во впадине кнутри от ключично-лопаточного сочленения?

- а) 10II шоу-сань-ли
- б) 11II цюй-чи
- в) 15II цзянь-юй
- г) 16II цзюй-гу

22. Какая акупунктурная точка располагается на середине расстрояния между латеральным надмышцелком и лучевым краем складок локтевого сгиба?

- а) 10II шоу-сань-ли
- б) 11II цюй-чи
- в) 15II цзянь-юй
- г) 16II цзюй-гу

23. Какая акупунктурная точка располагается ниже 11II цюй-чи на 2 цуня, у лучевого края лучевой кости?

- а) 10II шоу-сань-ли
- б) 11II цюй-чи
- в) 15II цзянь-юй
- г) 16II цзюй-гу

24. Какая акупунктурная точка располагается у верхнего края большеберцовой кости, во впадине кнаружи от колено-чашечной связки, на уровне нижнего края коленной чашечки?

- а) 25III тянь-шу
- б) 14IV фу-цзе
- в) 16IV фу-ай
- г) 35III ду-би

25. Какая акупунктурная точка располагается на третьей боковой линии живота, ниже точки 15IV да-хэн на 1,3 цуня?

- а) 25III тянь-шу
- б) 14IV фу-цзе
- в) 16IV фу-ай
- г) 35III ду-би

26. Какая акупунктурная точка располагается на третьей боковой линии живота, выше точки 15IV да-хэн на 3 цуня?

- а) 25III тянь-шу
- б) 14IV фу-цзе
- в) 16IV фу-ай
- г) 35III ду-би

27. Какая акупунктурная точка располагается в центре подколенной ямки?

- а) 34VII ся-ляо
- б) 40VII вэй-чжун
- в) 58VII фэй-ян
- г) 60 VII кунь-лунь

28. Какая акупунктурная точка соответствует третьему заднему крестцовому отверстию?

- а) 34VII ся-ляо
- б) 40VII вэй-чжун
- в) 58VII фэй-ян
- г) 60 VII кунь-лунь

29. Какая акупунктурная точка располагается выше центра латеральной лодыжки на 7 цуней?

- а) 34VII ся-ляо
- б) 40VII вэй-чжун
- в) 58VII фэй-ян
- г) 60 VII кунь-лунь

30. Какая акупунктурная точка располагается посередине между ахилловым сухожилием и латеральной лодыжкой?

- а) 34VII ся-ляо
- б) 40VII вэй-чжун
- в) 58VII фэй-ян
- г) 60 VII кунь-лунь

31. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме ЯН?

- а) лицо бледное с землистым оттенком
- б) жидкий стул
- в) поверхностный пульс
- г) сонливость

32. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме ЯН?

- а) пониженная температура тела
- б) распирающие боли в желудке после приема пищи
- в) плохая переносимость холода
- г) потливость на фоне слабости

33. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме ЯН?

- а) гиперрефлексия
- б) лицо бледное с землистым оттенком
- в) жидкий стул
- г) сонливость

34. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме ЯН?

- а) физическая выносливость
- б) отсутствие аппетита
- в) утомляемость
- г) сонливость

35. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме ЯН?

- а) гипоменорея
- б) лицо бледное с землистым оттенком
- в) жидкий стул
- г) гиперменорея

36. В течение какого времени при измерении электропроводности в тесте Накатани активный электрод соприкасается с кожными покровами в области репрезентативной точки?

- а) 2-3 сек
- б) 4-6 сек

- в) 8-10 сек
- г) 50-60 сек

37. Какие акупунктурные точки используются для проведения теста Накатани в качестве репрезентативных на ножных меридианах?

- а) 4IV, 2XII, 2VIII, 41XI, 43III, 64VII
- б) 3IV, 3XII, 3VIII, 40XI, 42III, 65VII
- в) 2IV, 4XII, 1VIII, 43XI, 44III, 67VII
- г) 5IV, 1XII, 6VIII, 44XI, 45III, 62VII

38. Какие акупунктурные точки используются для проведения теста Накатани в качестве репрезентативных на ручных меридианах?

- а) 9I, 7IX, 7V, 5VI, 4X, 5II
- б) 10I, 8IX, 8V, 3VI, 3X, 3II
- в) 8I, 6IX, 5V, 7VI, 5X, 6II
- г) 7I, 5IX, 4V, 8VI, 8X, 10II

39. Пальпаторное исследование какой точки следует предпринять для диагностики поражения меридиана сердца?

- а) 3XIV
- б) 25XI
- в) 1IX
- г) 14XIV

40. Какое время учитываются при проведении теста АКАБАНЕ?

- а) от начала прогревания точки до появления чувства жжения, укола
- б) от начала прогревания точки до появления непереносимой боли
- в) от начала прогревания точки до покраснения кожи
- г) от начала прогревания точки до развития ожога

41. Пальпаторное исследование какой точки следует предпринять для диагностики поражения меридиана перикарда?

- а) 3XIV
- б) 25XI
- в) 1IX
- г) 5XIV

42. Пальпаторное исследование какой точки следует предпринять для диагностики поражения меридиана тонкого кишечника?

- а) 23VII
- б) 25VII
- в) 27VII

г) 28VII

43. Какова ширина физиологического коридора на карте Риодораку в миллиметрах?

- а) 10
- б) 14
- в) 20
- г) 28

44. Какие значения электропроводности в репрезентативных точках используют для построения "физиологического коридора" на карте Риодораку?

- а) наибольшие величины
- б) средние величины
- в) наименьшие величины
- г) случайные величины

45. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме ИНЬ?

- а) эмоции резкие, подвижные
- б) повышенный тонус мышц
- в) поверхностный пульс
- г) глухой кашель

46. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме ИНЬ?

- а) эмоции слабые, торпидные
- б) блестящие глаза
- в) поверхностный пульс
- г) звонкий кашель

47. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме ИНЬ?

- а) высокая температура
- б) поведение активное
- в) запор
- г) сонливость

48. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме ИНЬ?

- а) судороги
- б) цвет языка красный
- в) цианоз губ
- г) потливость днем

49. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме ИНЬ?

- а) эмоции резкие, подвижные
- б) повышенный тонус мышц
- в) поверхностный пульс

г) гипоменорея

50. У ослабленных больных обычно рекомендуется использовать

- а) первый вариант раздражающего воздействия
- б) второй вариант раздражающего воздействия
- в) третий вариант раздражающего воздействия
- г) дисперсию

51. Пальпаторное исследование какой точки следует предпринять для диагностики поражения меридиана легких?

- а) 3XIV
- б) 25XI
- в) II
- г) 5XIV

52. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме избыточности меридиана легких?

- а) звонкий кашель
- б) хриплый кашель
- в) холодный пот
- г) головокружение

53. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме избыточности меридиана желудка?

- а) отсутствие аппетита
- б) чувство голода
- в) частая зевота
- г) чувство переполнения в желудке

54. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме избыточности меридиана сердца?

- а) чувство печали
- б) бледное лицо
- в) боли в области сердца
- г) головокружение

55. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме избыточности меридиана почек?

- а) задержка мочи
- б) недержание мочи
- в) обильное потоотделение
- г) ощущение холода в ногах

56. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме недостаточности меридиана толстой кишки?

- а) запор
- б) озноб
- в) вздутие живота
- г) понос

57. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме недостаточности меридиана селезенки?

- а) боли в суставах ног
- б) рвота
- в) вздутие живота
- г) тошнота, отрыжка

58. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме недостаточности меридиана тонкой кишки?

- а) звон в ушах
- б) запор
- в) головная боль
- г) боли в области пупка

59. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме недостаточности меридиана перикарда?

- а) чувство гневливости
- б) депрессивное состояние
- в) запор
- г) покраснение глаз

60. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме недостаточности меридиана печени?

- а) головокружение
- б) нарушение сна
- в) головная боль
- г) желтушность кожи

61. Повреждение артерии во время иглокалывания возможно при воздействии на точку:

- а) 1VII
- б) 16XIII
- в) 40VII

г) 8VI

62. Повреждение артерии во время иглокалывания возможно при воздействии на точку:

а) 11XII

б) 1III

в) 16XIII

г) 34XI

63. Глубокое введение акупунктурных игл не применяют для точек

а) в области шеи

б) в поясничной области

в) на голени

г) в области ягодиц

64. Укол под острым углом обычно применяют при локализации аурикулярных точек в проекции:

а) протикозелка

б) мочки уха

в) полости раковины

г) чаши раковины

65. Вертикальный укол обычно применяют при локализации аурикулярных точек в проекции:

а) верхней ножки противозавитка

б) ладьевидной ямки

в) мочки уха

г) нижней ножки противозавитка

66. Выберите показания для применения электроакупунктуры:

а) гипертонический криз

б) приступ стенокардии

в) эпилептический припадок

г) острый вертеброгенный болевой синдром

67. Показанием к применению лазеропунктуры является:

а) хронический тонзиллит

б) ночное недержание мочи

в) послеоперационное обезболивание

г) гипертонический криз

68. Показанием к применению лазеропунктуры является:

а) миопия у детей

б) почечная колика

в) невралгия лучевого нерва

г) приступ удушья при бронхиальной астме

69. Методы лазерной рефлексотерапии абсолютно противопоказаны больным

а) с невралгиями

б) с миофасциальными болевыми синдромами

в) с язвенной болезнью желудка

г) с геморрагическими синдромами

70. Методы лазерной рефлексотерапии абсолютно противопоказаны больным

- а) с цереброваскулярными заболеваниями
- б) с новообразованиями
- в) с ишемической болезнью сердца
- г) с бронхиальной астмой

71. Поражение какого органа возможно при нарушении правил техники безопасности для работы с лазерными установками?

- а) печень
- б) головной мозг
- в) глаза
- г) сердце

72. Показанием к применению краниопунктуры является

- а) афазия после острого нарушения мозгового кровообращения
- б) стенокардия
- в) хронический гастрит
- г) хронический пиелонефрит

73. Показанием к применению краниопунктуры является:

- а) эпилепсия
- б) гипертоническая болезнь
- в) центральный паралич после острого нарушения мозгового кровообращения
- г) пароксизмальная тахикардия

74. При расстройствах речи центрального генеза краниопунктуру у левшей следует проводить

- а) слева
- б) справа
- в) с двух сторон
- г) сторона укола не имеет значения

75. Показания к использованию первой пары чудесных меридианов?

- а) неврологические проявления остеохондрозов
- б) кожный зуд
- в) хронический бронхит
- г) стенокардия

76. Показания к использованию второй пары чудесных меридианов?

- а) неврологические проявления остеохондрозов
- б) хроническая пневмония
- в) хронический бронхит
- г) ПНМК

77. Показания к использованию третьей пары чудесных меридианов?

- а) неврологические проявления остеохондрозов
- б) кожный зуд
- в) хронический бронхит
- г) стенокардия

78. Показания к использованию первой пары чудесных меридианов?

- а) неврологические проявления остеохондрозов
- б) функциональные гиперкинезы
- в) бронхиальная астма
- г) стенокардия

79. Точками ключами для первой пары чудесных меридианов являются?

- а) 5X, 41XI
- б) 3VI, 62VII
- в) 6VIII, 7I
- г) 6IX, 4IV

80. Точками ключами для четвертой пары чудесных меридианов являются?
- а) 5X, 41XI
 - б) 3VI, 62VII
 - в) 6VIII, 7I
 - г) 6IX, 4IV
81. Точкой группового ло для второй пары чудесных меридианов являются?
- а) 8X
 - б) 39XI
 - в) 5IX
 - г) 6IV
82. Точкой группового ло для третьей пары чудесных меридианов являются?
- а) 8X
 - б) 39XI
 - в) 5IX
 - г) 6IV
83. Точкой соединения для первой пары чудесных меридианов являются?
- а) 8III
 - б) 2III
 - в) 3XIV
 - г) 22XI
84. Точкой соединения для четвертой пары чудесных меридианов являются?
- а) 8III
 - б) 2III
 - в) 3XIV
 - г) 22XI
85. Первый вид связей между меридианами осуществляется
- а) за счет ло-пунктов
 - б) на кончиках пальцев в тинговых точках, между иньскими и янскими меридианами
 - в) посредством чудесных меридианов
 - г) между янскими ручными и ножными меридианами на голове
86. Четвертый вид связей между меридианами осуществляется
- а) за счет ло-пунктов
 - б) на кончиках пальцев в тинговых точках, между иньскими и янскими меридианами

- в) посредством чудесных меридианов
- г) между янскими ручными и ножными меридианами на голове

87. Какие точки являются специфическими точками для лечения периферических нервов?

- а) 60 VII
- б) 3VI, 4II
- в) 3V, 8IX
- г) 10VII, 12XIV

88. Какие точки являются специфическими точками для лечения ваготонии?

- а) 60 VII
- б) 3VI, 4II
- в) 3V, 8IX
- г) 10VII, 12XIV

89. Какие точки являются специфическими точками для лечения психической депрессии?

- а) 60 VII
- б) 3VI, 4II
- в) 3V, 8IX
- г) 10VII, 12XIV

90. Какие точки являются специфическими точками для лечения верхней конечности?

- а) 60 VII
- б) 3VI, 4II
- в) 3V, 8IX
- г) 10VII, 12XIV

91. Какие точки являются специфическими точками для лечения половых расстройств?

- а) 26XI, 4XIV
- б) 10VII, 12XIV
- в) 3V, 8IX
- г) 39XI

92. Какие точки являются специфическими точками для лечения заболеваний спинного мозга?

- а) 26XI, 4XIV
- б) 10VII, 12XIV

в) 3V, 8IX

г) 39XI

93. Какая точка более эффективна при лечении болей по ходу меридиана легких?

а) 6I

б) 10I

в) 1I

г) 11I

94. Какая точка более эффективна при лечении болей по ходу меридиана мочевого пузыря?

а) 6VII

б) 15VII

в) 59VII

г) 36VII

95. Абсолютным противопоказанием для проведения рефлексотерапии является?

а) новообразования

б) вертеброгенные синдромы

в) бронхиальная астма

г) полиневропатия

96. Какое максимальное количество игл можно использовать для лечения детей до 1 года?

а) 4-5

б) 3

в) 10-11

г) 8-9

97. Какое максимальное количество игл можно использовать для лечения детей в возрасте 3-5 лет?

а) 4-5

б) 3

в) 10-11

г) 8-9

98. Какое максимальное время экспозиции игл при лечении детей в возрасте 1-3 лет?

а) 30 секунд

б) 6 минут

в) 20 минут

г) 3-4 минуты

99. Какое максимальное время экспозиции игл при лечении детей в возрасте 5-7 лет?

а) 10 минут

б) 6 минут

в) 20 минут

г) 3-4 минуты

100. Какова глубина введения игл при лечении детей в возрасте до 1 года?

а) 1 мм

б) 3-5 мм

в) 0,5 мм

г) каноническая

101. При каких процедурах возможно заражение пациента ВИЧ-инфекцией:

1. Переливание крови и ее компонентов;
2. Трансплантация органов и тканей;
3. в/м инъекция одноразовым шприцем;
4. физиотерапевтические процедуры;
5. любая парентеральная процедура, при которой произошел несчастный случай с повреждением кожи или слизистой;
6. фиброгастроскопия;
7. визуальный осмотр.

102. Действие медработника в случае попадания крови на слизистую глаза:

1. Обработать 20% раствором сульфацила;
2. Промыть большим количеством воды.

103. Анонимное обследование на ВИЧ – инфекцию проводится в следующих случаях :

1. По желанию пациента;
2. При отсутствии у пациента документов удостоверяющих личность;
3. При обследовании пациента при получении сертификата об отсутствии ВИЧ - инфекции.

104. Причиной ложноотрицательных результатов на ВИЧ-инфекцию являются:
1. Обследование пациента в период «серонегативного окна»
 2. Несвоевременная доставка пробы биоматериала в лабораторию;
 3. Наличие у пациента туберкулеза, сифилиса;
 4. Инфицированность пациента вирусными гепатитами.
105. Риск заражения ВИЧ-инфекцией при переливании инфицированной крови:
1. Приближается к 100%;
 2. 30-50%;
 3. Отсутствует;
 4. 3-5%.
106. Вы узнали о диагнозе ВИЧ-инфекция у вашего пациента, ваши действия:
1. Сообщите своим коллегам о диагнозе;
 2. Примите все меры предосторожности при обслуживании вами больного;
 3. Сделаете отметку в истории болезни или амбулаторной карте о данном диагнозе;
 4. Прежде, чем обслуживать больного, сообщите о нем в администрацию ЛПУ, получите разрешение на его обслуживание.
107. Подлежат ли обследованию на антитела к ВИЧ лица с инфекциями, обусловленными вирусом простого герпеса:
1. генитальный герпес;
 2. с хроническими, рецидивирующими формами заболевания;
 3. с острой локализованной формой;
 4. не подлежат.
108. Выберите, где есть риск заражения ВИЧ-инфекцией:
1. Повторном использовании одноразового гинекологического зеркала без стерилизации;
 2. Однократном использовании одноразового шприца и иглы;
 3. Повторном использовании одноразового шприца несколькими пациентами, меняя только инъекционные иглы;
 4. При проведении бронхоскопии, ФГС.
109. Действие медработника в случае попадания крови в рот:
1. Прополоскать большим количеством воды, затем прополоскать 70* этиловым спиртом;
 2. Прополоскать 70* спиртом;
 3. Прополоскать 0,05% раствором перманганата калия.
110. Подлежат ли обследованию на ВИЧ- лица с:
1. Глубокими микозами;
 2. Дизентерией;
 3. Рецидивирующим опоясывающим лишаем у лиц моложе 60 лет;
 4. Нейродермитом;
 5. Гриппом;
 6. Анемией.
111. Кто имеет право подписывать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от медицинского вмешательства?
- А) гражданин, нуждающийся в медицинской помощи;

- Б) один из родителей;
- В) законный представитель гражданина;
- Г) медицинский работник;
- Д) все вышеперечисленные.

112. Какие виды экспертиз проводятся в соответствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ» от 21.11.2011г. №323-ФЗ?

- А) экспертиза временной нетрудоспособности;
- Б) экспертиза качества медицинской помощи;
- В) военно-врачебная экспертиза;
- Г) медико-социальная экспертиза;
- Д) экспертиза профессиональной пригодности;
- Е) экспертиза связи заболевания с профессией;
- Ж) судебно-медицинская;
- З) судебно-психиатрическая экспертиза;
- И) все вышеперечисленные.

113. На какой срок может выдать листок нетрудоспособности врач единолично?

- А). на срок не более 15 дней;
- Б) на срок не более 30 дней;
- В) на весь срок нетрудоспособности.

114. Какие формы контроля качества и безопасности медицинской деятельности определены в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ?

- А) государственный контроль;
- Б) ведомственный контроль;
- В) внутренний контроль;
- Г) все вышеперечисленные.

115. Как часто может гражданин выбрать медицинскую организацию для получения первичной медико-санитарной помощи, в том числе по территориально-участковому принципу?

- А) не чаще чем два раза в год;
- Б) не чаще чем один раз в год;
- В) не чаще одного раза в 2 года.

116. Кто имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документацией пациента, отражающей состояние его здоровья?

- А) пациент и его законный представитель;
- В) родственники;
- Д) работодатели.

117. Каким Приказом в настоящее время утвержден порядок выдачи листков нетрудоспособности?

- А) приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011г. №624н «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности»;
- В) приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.08.2007г. №514 «О порядке выдачи медицинскими организациями листков нетрудоспособности»;
- Д) приказом ФСС РФ №18, Минздрава РФ №29 от 29.01.2004г. «Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения».

118. Каким Приказом в настоящее время утверждена форма бланка листка нетрудоспособности?

- А) приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011г. №624н «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности»;
- В) приказом Минздравсоцразвития от 26.04.2011г. №347н «Об утверждении формы бланка листка нетрудоспособности»;
- Д) приказом ФСС РФ №18, Минздрава РФ №29 от 29.01.2004г. «Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения».

119. Каким приказом утверждена Инструкция о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения?

А) приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011г. №624н «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности»;

В) приказом Минздравсоцразвития от 26.04.2011г. №347н «Об утверждении формы бланка листка нетрудоспособности»;

Д) приказом ФСС РФ №18, Минздрава РФ №29 от 29.01.2004г. «Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения».

120. Укажите основные принципы охраны здоровья граждан в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

А) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий;

Б) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи;

В) приоритет охраны здоровья детей;

Г) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;

Д) ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья;

Е) доступность и качество медицинской помощи;

Ж) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи;

З) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;

И) соблюдение врачебной тайны;

К) всё вышеперечисленное.