

**Тестовый контроль
по специальности
«Дерматовенерология»
вторая категория**

1. Дерматологический диагноз формулируется, включая все перечисленное, кроме
 - а) нозологической формы
 - б) клинической формы
 - в) характера течения
 - г) стадии процесса
 - д) эффективности предшествующего лечения

2. Гипоаллергенная диета может назначаться больным
 - а) псориазом
 - б) буллёзными дерматозами
 - в) склеродермией
 - г) экземой, атопическим дерматитом
 - д) все перечисленное

3. Акантолиз-это
 - а) разрушение межклеточных мостиков клеток шиповидного слоя
 - б) скопление серозной жидкости
 - в) образование внутридермальных пузырей
 - г) дегенеративные изменения эпидермальных клеток, утративших связь с окружающими и плавающими в пузырьной жидкости
 - д) всё перечисленное

4. К препаратам, блокирующим H₂-гистаминовые рецепторы, относится
 - а) циметидин
 - б) димедрол
 - в) супрастин
 - г) фенкарол
 - д) диазолин

5. Антигистаминные препараты I-го поколения характеризуются следующими фармакологическими свойствами, кроме
- а) оказывают седативное и снотворное действие
 - б) дают быстрый и сильный, но кратковременный (4-8 часов) лечебный эффект
 - в) потенцирует воздействие алкоголя
 - г) вызывают привыкание
 - д) оказывают кардиотоксический эффект
6. К препаратам, тормозящим высвобождение медиаторных веществ из тучных клеток, относятся
- а) задитен
 - б) лоратадин
 - в) циметидин
 - г) ни один из указанных
7. Неспецифическое гипосенсибилизирующее действие оказывают все перечисленные препараты, кроме
- а) кортикостероидов
 - б) антигистаминных препаратов
 - в) препаратов кальция
 - г) тиосульфата натрия
 - д) транквилизаторов
8. Дезинтоксикационным эффектом обладают
- а) гипосульфит натрия
 - б) реамберин
 - в) аскорбиновая кислота
 - г) сернокислая магнезия
 - д) все перечисленное
9. Гиперергические реакции, связанные с клеточными антителами, имеют следующие проявления
- а) буллезные
 - б) эксфолиативные
 - в) геморрагические

- г) экзематозные
- д) все перечисленные

10. К лечебному питанию больных акантолитическими буллезными дерматозами предъявляются все перечисленные требования, исключая обогащение

- а) животными белками
- б) продуктами, содержащими соли калия
- в) углеводами и жирами
- г) продуктами, содержащими хлорид натрия
- д) правильно в) и г)

11. Алкоголь влияет на эффективность лекарств путем

- а) изменения резорбции и метаболизма лекарств
- б) повышения токсичности барбитуратов
- в) повышения эффективности оральных сахароснижающих препаратов
- г) правильно а) и б)
- д) правильно б) и в)

12. Дерма состоит

- а) из волокнистых субстанций
- б) из основного межклеточного вещества
- в) из клеточных элементов
- г) из сосудов и нервов
- д) из всего перечисленного

13. Системные аллергические реакции замедленного типа, связанные с клеточными антителами, вызывают все перечисленное, кроме

- а) генерализованного аллергического дерматита
- б) грибковоподобной эритемато-везикулезной сыпи
- в) гиперергических реакций
- г) крапивницы
- д) обострения основного заболевания (коллагенозы, экзема и пр.)

14. О начале «синдрома отмены» при лечении глюкокортикоидными гормонами свидетельствуют

- а) анорексия
- б) недомогание
- в) гипотония
- г) миалгия
- д) все перечисленное

15. Лечебное питание больных себореей и вульгарными угрями предусматривает все перечисленное, кроме

- а) гипоаллергенной диеты
- б) уменьшения в рационе животных жиров
- в) исключения поваренной соли
- г) исключения острых блюд
- д) ограничения углеводов

16. Лечебное питание больных дерматитом Дюринга требует исключения

- а) продуктов из пшеничной и ржаной муки
- б) круп содержащих глютен
- в) острых блюд
- г) углеводов
- д) правильно все, кроме г)

17. Экскреция лекарств с высоким молекулярным весом производится в основном

- а) почками
- б) желчной системой
- в) кишечником
- г) легкими
- д) железами кожи

18. К побочному действию лекарств относятся

- а) токсические реакции
- б) дисбактериоз
- в) массивный бактериолиз (реакция Герксгеймера)
- г) реакция с особой чувствительностью
- д) всё перечисленное

19. Пути введения лекарственных веществ могут быть

- а) внутривенный
- б) внутримышечный
- в) подкожный
- г) эндолимфатический
- д) все перечисленное

20. Начало лечения иглорефлексотерапией при хронических заболеваниях возможно во все периоды, кроме

- а) периода обострения
- б) периода стабилизации воспалительного процесса
- в) периода частичной или полной ремиссии
- г) периода фиксированных сезонных обострений
- д) правильно в) и г)

21. При фурункулезе обязательно исследование

- а) крови на сахар
- б) крови на билирубин
- в) мочи на креатинин
- г) кала на гельминты
- д) всего перечисленного

22. В патогенезе розацеа имеют значение следующие факторы, кроме

- а) ангионевротических расстройств
- б) инсоляции
- в) себорейного дерматита
- г) ринофимы
- д) непереносимости глютена

23. Себорея способствует развитию всех перечисленных ниже заболеваний, кроме

- а) вульгарных угрей
- б) розацеа
- в) себорейного дерматита
- г) ринофимы
- д) ксантелазмы

24. Трихонодозис – это
- а) узловатые образования на стержне волоса
 - б) пучки коротких волос
 - в) веретеновидные волосы
 - г) спутанные волосы
25. При артропатическом псориазе целесообразно назначить все перечисленное, кроме
- а) пенициллина и преднизолона
 - б) нестероидных противовоспалительных препаратов
 - в) оксиферрискорбона
 - г) детоксицирующих средств
 - д) антиоксидантов
26. Типичные высыпные элементы красного плоского лишая имеют следующие особенности, кроме
- а) папул плоских, полигональных, красновато-сиреневого цвета
 - б) вдавления в центре папулы
 - в) восковидного блеска
 - г) сетки Уикхема на поверхности папул
 - д) преимущественной локализацией на лице
27. Проявления бляшечного параспориоза характеризуются следующими признаками, кроме:
- а) желтовато-бурых пятен с четкими границами
 - б) небольшого шелушения мелкими чешуйками, иногда незаметного, выявляющегося с помощью граттажа
 - в) преимущественной локализации на туловище и нижних конечностях
 - г) отсутствия зуда
 - д) выраженной инфильтрации и нарушения общего состояния
28. При гипотиреозе развивается
- а) генерализованная микседема
 - б) узелковая микседема
 - в) претибальная микседема

- г) все перечисленное
 - д) ничего из перечисленного
29. Телеангиоэктатическая форма пигментной крапивницы обычно наблюдается
- а) в детском возрасте
 - б) исключительно у взрослых больных
 - в) с самого рождения
 - г) в пубертантный период
 - д) в любом возрасте с одинаковой частотой
30. Гистологические изменения при кольцевидной гранулеме включают
- а) фокусный некробиоз коллагена средней части дермы
 - б) радиально расположенный клеточный инфильтрат из лимфоцитов, гистиоцитов, эпителиоидных клеток, гигантских клеток типа инородного тела
 - в) расширение сосудов верхней части дермы, набухание эндотелия, утолщение стенки сосудов, периваскулярные лимфоидно-гистиоцитарные инфильтраты, возможен стаз эритроцитов
 - г) фрагментация и отечность коллагена средней части дермы
 - д) все перечисленное
31. Причиной дерматозов, развивающихся при сахарном диабете, является
- а) снижение защитной функции кожи
 - б) нарушение обмена веществ
 - в) микроангиопатии
 - г) аллергические реакции
 - д) все перечисленное
32. Мочка ушной раковины наиболее часто поражается
- а) при псориазе
 - б) при себорейном дерматите
 - в) при микотической экземе
 - г) при стрептодермии
 - д) при контактном дерматите

33. Саркома Капоши при СПИДе (эпидемическая форма) в отличие от идиопатической классической формы, характеризуется всем перечисленным, кроме
- а) молодого возраста больных
 - б) внезапного развития и стремительного прогрессирования распространенных узелковых и опухолевых образований
 - в) отсутствия субъективных ощущений и осложнения вторичной инфекцией
 - г) атипичной локализации на голове, шее, туловище, во рту
 - д) сочетания с висцеральными поражениями и увеличением лимфатических узлов
34. Гиперэластическая кожа (синдром Элерса – Данлоса) характеризуется всем перечисленным, кроме
- а) проявления с раннего детского возраста
 - б) повышенной ранимости кожи с легким образованием гематом, медленно заживающих ран и атрофических рубцов
 - в) чрезмерной растяжимости кожи в области суставов и на лице
 - г) чрезмерной гибкости и подвывихов суставов
 - д) ангиоидных полос на сетчатке глаз
35. Лентиго отличается от веснушек всем перечисленным, кроме
- а) большего размера пятен
 - б) ущемствования с первого года жизни
 - в) отсутствия приуроченности к участкам, подвергающимся инсоляции
 - г) увеличения количества меланоцитов в биоптате из пятна
 - д) более светлой окраски
36. Инфекции ВИЧ не передаются
- а) трансфузионным путем
 - б) трансмиссивным путем
 - в) от заболевшей матери к плоду
 - г) инъекционным путем
 - д) половым путем
37. СПИДу могут сопутствовать
- а) оппортунистические инфекции внутренних органов

- б) поражения нервной системы
- в) эпидемическая саркома Капоши
- г) волосатая лейкоплакия языка
- д) все перечисленное

38. Для стрептококкового импетиго характерно все перечисленное, кроме

- а) появления на коже фликтен
- б) желтых корок
- в) быстрого распространения
- г) воспалительных узлов
- д) воспалительного ободка вокруг фликтен

39. При стрептококковом импетиго назначается все перечисленное, кроме

- а) растворов анилиновых красок
- б) мазей со стероидными гормонами
- в) вскрытия фликтен
- г) паст с антибиотиками
- д) мазей с антибиотиками

40. Для простого пузырькового лишая характерны все перечисленные признаки, кроме

- а) эритемы
- б) отека
- в) группы пузырьков
- г) пузырей
- д) эрозий

41. Простой контактный дерматит характеризуется всем перечисленным, кроме

- а) четких границ
- б) локализации в местах контакта раздражителя
- в) волдырей
- г) гиперемии
- д) жжения

42. К препаратам, предназначенным для наружного применения при лечении простого и опоясывающего герпеса, относятся все перечисленные, кроме

- а) оксолиновой мази

- б) линимента госсипола
- в) ихтиоловой мази
- г) теброфеновой мази
- д) мази заверакс

43. Токсикодермия характеризуется

- а) бурной воспалительной реакцией
- б) большой распространённостью вплоть до эритродермии
- в) нарушением общего состояния
- г) быстрым регрессом после устранения контакта с аллергеном
- д) всем перечисленным

44. Для опоясывающего лишая характерны

- а) эритема
- б) отек
- в) язвы
- г) некроз
- д) все перечисленное

45. Физиотерапевтическое лечение опоясывающего лишая целесообразно назначать

- а) в начале заболевания
- б) в острой фазе
- в) в неполной ремиссии
- г) при неврологических осложнениях
- д) правильно в) и г)

46. Поливалентная герпетическая вакцина назначается больным

- а) простым герпесом в остром периоде
- б) простым герпесом в период обратного развития высыпаний
- в) рецидивирующим герпесом в период полной ремиссии
- г) рецидивирующим герпесом в период неполной ремиссии
- д) во всех перечисленных случаях

47. К разновидностям простого пузырькового лишая в зависимости от локализации относится

- а) герпес лица (губ, носа и т.д.)
- б) герпес гениталий
- в) герпетический кератит и гингивостоматит
- г) герпетический менингоэнцефалит
- д) все перечисленное

48. Целью симптоматической терапии при герпетической инфекции является

- а) ограничить распространение очагов инфекции и предупредить их нагноение
- б) противорецидивное действие
- в) санировать очаг вирусной инфекции
- г) достичь иммунотерапевтического эффекта
- д) все перечисленное

49. При лечении метотрексатом больных псориазом нежелательно применять все перечисленные препараты, кроме

- а) ретиноидов
- б) сульфониламидов
- в) салицилатов, нестероидных противовоспалительных средств
- г) тетрациклинов
- д) пантотената кальция и гепатопротекторов

50. Использование в лечении герпетической инфекции интерферона и индукторов интерферона

- а) защищает неинфицированные вирусом клетки (ткани)
- б) подавляет репродукцию вируса
- в) стимулирует специфический иммунитет
- г) стимулирует неспецифический иммунитет
- д) предупреждает пиогенизацию очагов

51. Лечение ребенка с микроспорией волосистой части головы следует проводить

- а) амбулаторно
- б) в стационаре
- в) по желанию родителей
- г) по усмотрению врача

д) возможны все перечисленные варианты

52. Ребенок, лечившийся по поводу микроспории волосистой части головы, может посещать школу после

- а) одного отрицательного анализа
- б) второго отрицательного анализа
- в) третьего отрицательного контрольного анализа
- г) шестого отрицательного контрольного анализа
- д) сразу после окончания лечения

53. Различают следующие формы споротрихоза

- а) поверхностная
- б) локализованная подкожная
- в) диссеминированная кожная
- г) висцеральная
- д) все перечисленные

54. Подмышечный трихомикоз вызывается

- а) стрептококками
- б) грибами
- в) стафилококками
- г) коринебактериями
- д) вирусами

55. К противокандидозным средствам для лечения кожи относятся все перечисленные, кроме

- а) мазей нистатиновой, амфотерициновой, декаминовой 0.5-1%
- б) 0.25% спиртового или водного раствора анилиновых красителей
- в) левориновой взвеси (2 г леворина, 20 мл 95% этилового спирта, 1000 мл

дистиллированной воды)

- г) бонафтоновой, оксолиновой или теброфеновой мазей
- д) клотримазола

56. Хронический кандидоз слизистых связан с

- а) гипотиреозом

- б) гипопаратиреодизмом
- в) гипокортицизмом
- г) понижением секреторной функции половых желез
- д) со всем перечисленным

57. К побочным действиям нистатина относятся все перечисленные, кроме

- а) тошноты
- б) рвоты
- в) жидкого стула
- г) повышения температуры
- д) дерматитов

58. Развитию кандидоза способствует все перечисленное, кроме

- а) сахарного диабета
- б) длительного лечения антибиотиками
- в) потливости, мацерации кожи
- г) иммунодефицита
- д) гипертонической болезни

59. Плесневые грибы поражают все перечисленное, кроме

- а) кожи
- б) слизистых
- в) ногтей
- г) внутренних органов
- д) волос

60. Онихолизис может возникнуть на фоне

- а) кожных болезней
- б) травматизации
- в) эндокринных нарушений
- г) бактериальных и грибковых инфекций
- д) всего перечисленного

61. Атрофия ногтевых пластинок может развиваться при

- а) болезнях центральной и периферической нервной системы

- б) эндокринопатиях
- в) травматизации и нарушениях кровообращения
- г) грибковых поражениях
- д) всем перечисленным

62. Для разноцветного лишая характерно

- а) хроническое течение
- б) наличие пятен
- в) отрубевидное шелушение
- г) фестончатое очертание очагов
- д) все перечисленное, кроме г)

63. Источником инфекции при споротрихозе является

- а) почва, мох
- б) злаки
- в) древесные материалы
- г) испражнения голубей
- д) все перечисленное, кроме г)

64. Современное название возбудителей трихофитии

- а) трихофитон фиолетовый
- б) тонзурас
- в) акуминатный
- г) кратериформный
- д) правильно а) и б)

65. Микроскопическое отличие пораженного волоса при инфильтративно-нагноительной трихофитии касается

- а) эндотрикса
- б) эктотрикса
- в) спор, расположенных цепочкой
- г) спор, расположенных хаотично
- д) правильно б) и в)

66. При исследовании бледной трепонемы методом электронной микроскопии

выявляются все образования, кроме

- а) чехла
- б) жгутиков
- в) фибрилл
- г) цитоплазматической мембраны

67. В реализации иммунного ответа при сифилисе участвуют следующие образования, кроме

- а) эритроцитов
- б) макрофагов
- в) Т-лимфоцитов
- г) В-лимфоцитов

68. При сифилитическом регионарном склеродените в патологический процесс вовлекается

- а) капсула лимфатического узла
- б) ткань лимфатического узла
- в) окружающая клетчатка
- г) прилежащая к узлу кожа

69. Шанкр-амигдалит представляет из себя

- а) эрозию миндалина
- б) язву миндалина
- в) увеличенную в размерах гиперемизованную миндалину
- г) увеличенную в размерах обычной окраски миндалину

70. Высыпания при вторичном свежем сифилисе обычно

- а) необильные
- б) обильные
- в) несимметричные
- г) неярко окраски
- д) сгруппированные

71. Разновидностями сифилитической плешивости являются все формы, кроме

- а) мелкоочаговой

- б) крупноочаговой
- в) диффузной
- г) смешанной
- д) тотальной

72. Бугорковый сифилис следует дифференцировать со всеми перечисленными заболеваниями, кроме

- а) туберкулеза кожи
- б) лейшманиоза
- в) лепры
- г) глубоких микозов
- д) каплевидного параспориоза

73. Основными препаратами для лечения больных сифилисом являются

- а) препараты пенициллина
- б) препараты тетрациклина
- в) препараты эритромицина
- г) макролиды

74. Дифференциальную диагностику папулезного сифилида следует проводить со всеми перечисленными заболеваниями, кроме

- а) красного плоского лишая
- б) каплевидного псориаза
- в) псориаза
- г) болезни Реклингаузена

75. Патогномоничным симптомом позднего врожденного сифилиса является

- а) ягодицеобразный череп
- б) бочкообразные зубы
- в) гетчинсоновские зубы
- г) широко расставленные верхние резцы

76. В течение фрамбезии выделяют все перечисленные периоды, кроме

- а) инкубационного
- б) первичного

- в) вторичного
- г) третичного
- д) поражения внутренних органов

77. Основным путем заражения мягким шанкром является

- а) половой контакт
- б) возможно заражение через предметы
- в) возможен неполовой путь инфицирования
- г) необходимо нарушение целостности рогового слоя кожи и покровного эпителия слизистых
- д) заражение возможно при сохранной целостности рогового слоя кожи и покровного эпителия слизистой

78. Отделяемое из фистулезного хода при венерическом лимфогранулематозе

- а) серозное
- б) кровянистое
- в) сливкообразное или гнойное
- г) крошкообразное
- д) отделяемого нет

79. Число оборотов спирали бледной трепонемы составляет

- а) 2-4
- б) 6-8
- в) 8-12
- г) 12-14

80. Наиболее чувствительным серологическим тестом на сифилис является

- а) реакция иммунофлюоресценции (РИФ)
- б) реакция пассивной гемагглютинации (РПГА)
- в) реакция микропреципитации (МРП)
- г) реакция иммобилизации трепонем (РИБТ)
- д) иммуноферментный анализ с определением суммарных антител

81. Возбудитель гонореи - гонококк - относится

- а) к парным коккам грам-отрицательным

- б) к парным коккам грам-положительным
- в) к парным коккам грам-вариабельным
- г) коккобациллам грам-отрицательным
- д) коккобациллам грам-вариабельным

82. Бактериоскопическая идентификация гонококков

основывается на следующих признаках, кроме

- а) парности кокков
- б) грам-отрицательности
- в) грам-положительности
- г) внутриклеточного расположения
- д) бобовидности формы

83. В средах с сахарами гонококк разлагает

- а) лактозу
- б) галактозу
- в) декстрозу
- г) сахарозу
- д) рибозу

84. Наиболее частой причиной рецидивов гонореи является ассоциация гонококков

- а) с хламидиями
- б) с дрожжевым мицелием
- в) с трихомонадами
- г) с уреаплазмой
- д) с гарднереллами

85. Экспериментально гонорея получена у следующих лабораторных животных

- а) у человекообразных обезьян
- б) у морских свинок
- в) у кроликов
- г) у собак
- д) ни у одного животного

86. Наиболее доступным для поражения гонококками являются слизистые оболочки, выстланные

- а) многослойным плоским неороговевающим эпителием
- б) переходным эпителием
- в) цилиндрическим эпителием
- г) многослойным плоским ороговевающим эпителием
- д) кубическим эпителием

87. Гонококки могут распространяться в организме больных следующими путями, кроме

- а) лимфогенного
- б) гематогенного
- в) по поверхности слизистых гениталий
- г) трансканаликулярного
- д) всеми перечисленными путями

88. Длительность инкубационного периода при гонорее чаще равна

- а) 1-2 дням
- б) 3-4 дням
- в) 5-7 дням
- г) 8-10 дням
- д) 10-14 дням

89. Свежий острый передний уретрит гонорейной этиологии характеризуется всеми перечисленными признаками, кроме

- а) обильных гнойных выделений
- б) болезненности при мочеиспускании
- в) гиперемии губок наружного отверстия уретры
- г) наличия гнойных нитей в 1-й и 2-й порциях мочи
- д) наличия гнойных нитей в 1-й порции мочи

90. У женщин, больных гонореей, наиболее часто наблюдается следующая клиническая форма

- а) свежая острая
- б) свежая подострая

- в) свежая торпидная
- г) латентная
- д) хроническая

91. Перечислите физиологические состояния, возникающие у новорожденных между 3 и 8 днем жизни:

- а) нагрубание молочных желез
- б) десквамационный вульвовагинит
- в) акне неонаторум
- г) гидроцеле
- д) все перечисленное

92. Сопутствующими заболеваниями, наиболее часто выявляемыми у детей, больных кандидозом, являются:

- а) хронические рецидивирующие, острые респираторные вирусные инфекции, бронхиты, пневмонии
- б) гнойные отиты и хронические тонзиллиты
- в) атопический дерматит
- г) астмоидный бронхит
- д) все перечисленное

93. К осложнениям избыточной функции сальных желез у младенцев относят:

- а) милиум
- б) гнейс
- в) себорейный дерматит
- г) все перечисленное верно
- д) верно б и в

94. Для жизни новорожденного ребенка прогноз благоприятен при:

- а) склереме
- б) склередеме
- в) ихтиозе
- г) булезном эпидермолизе
- д) все верно

- 95 Для эпидемической пузырчатки новорожденных характерно:
- а) температура выше 38°C
 - б) локализация пузырей на ладонях, подошвах
 - в) локализация пузырей везде, кроме ладоней и подошв
 - г) плотный инфильтрат в основании пузырей
 - д) мягкое основание пузырей
- 96 При склереме новорожденных наблюдается:
- а) тахикардия
 - б) тяжелое общее состояние
 - в) повышение температуры тела
 - г) понижение температуры тела
 - д) брадикардия
- 97 Есть ли необходимость назначать специальную терапию при красной волчанке новорожденных?
- а) да
 - б) нет
 - в) решается индивидуально
- 98 Уменьшение или отсутствие числа эозинофилов в крови характерно для:
- а) десквамативной эритродермии Лайнера
 - б) болезни Дюринга
 - в) эозинофильной гранулемы
 - г) эксфолиативного дерматита Риттера
 - д) верно а) и в)
- 99 Основными симптомами десквамативной эритродермии у детей являются:
- а) стойкие отеки
 - б) диарея
 - в) генерализованная сыпь в виде сплошной эритродермии
 - г) задержка прибавления массы тела
 - д) все перечисленное

100. Антигенное отягощение, способствующее обострению atopического дерматита у ребёнка может быть связано со всем перечисленным, кроме

- а) избытка белковых продуктов
- б) витаминных препаратов
- в) хронической фокальной инфекции
- г) применение полифепана
- д) применение антибиотиков

101. Перечислите группы повышенного риска для инфицирования ВИЧ:

- а) Доноры биологических жидкостей;
- б) Родители взрослого ВИЧ-инфицированного;
- в) Лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией (гомо-, бисексуалы);
- г) Лица, перенесшие хирургическую операцию;
- д) Работники коммерческого секса;
- е) Лица, употребляющие наркотики внутривенно;
- ж) Лица, проходящие лечение у стоматолога, пациенты гемодиализа.

102. Риск заражения в случае попадания инфицированной крови на неповрежденную кожу:

- а) 0,0001;
- б) 0,003;
- в) отсутствует

103. Назовите отличия в обслуживании ВИЧ-инфицированного пациента при проведении парентеральной процедуры:

- а) Одноразовые: маска, халат, перчатки, очки;
- б) Одеть двойные латексные перчатки;
- в) Наличие дополнительной емкости с дез. раствором максимальной концентрации;
- г) Дополнительно обработать руки для проведения хирургических вмешательств
- д) Обработать ногтевые фаланги спиртовым раствором йода из аптечки;
- е) Выполнять процедуру в присутствии дублера.

104. У новорожденного, рожденного от ВИЧ-инфицированной матери антитела к ВИЧ:

- а) Присутствуют в крови;
- б) Отсутствуют в крови;
- в) Зависит от того, инфицирован ребенок или нет (внутриутробно).

105. Выберите принципы профилактики полового пути передачи ВИЧ:

- а) Избегать случайных половых связей;
- б) Не пользоваться услугами коммерческого секса;
- в) Всегда использовать средства защиты;
- г) Пользоваться услугами коммерческого секса;
- д) Использовать травмирующие секс-игрушки;
- е) Своевременно лечить воспалительные заболевания гинекологической сферы;
- ж) Не использовать травмирующие секс-игрушки.

106. Дотестовое консультирование по ВИЧ – инфекции проводится:

- а) При наличии любого показания для обследования пациента на ВИЧ – инфекцию;
- б) Только при проведении обязательного обследования пациента на ВИЧ – инфекцию.

107. Для постконтактной химиопрофилактики ВИЧ – инфекции при несчастном случае на производстве используется:

- а) Фортоваза;
- б) Калетра (лопинавир/ритонавир)
- в) Зерит;
- г) Комбивир (зидовудин/ламивудин)
- д) Курс ВААРТ сроком на 30 дней;
- е) Антибиотики.

108. Свойствами вируса является:

- а) Склонность к мутации;
- б) Способность некоторое время сохранять свойства во внешней среде;
- в) Устойчивость к воздействию радиации;
- г) Сравнительная устойчивость к воздействию радиации;
- д) Устойчивость к воздействию высоких температур.

109. Что нужно сделать при несчастном случае на производстве:

- а) Рекомендуется провести эпидрасследование несчастного случая на производстве;
- б) Оказать себе самопомощь, используя аптечку для профилактики ВИЧ-инфекции;
- в) Сообщить представителю администрации об аварии;

- г) Уточнить данные по ВИЧ-статусу пациента или обследовать его на антитела к ВИЧ экспрестестами с последующим обследованием через лабораторию;
- д) Сообщить родственникам пациента о факте аварии;
- е) Зарегистрировать факт аварии в журнале регистрации несчастных случаев на производстве;
- ж) Медработнику обследоваться на наличие антител к ВИЧ вскоре после аварии экспрестестами с последующим обследованием через лабораторию;
- з) Обратиться к доверенному врачу по ВИЧ-инфекции с целью назначения постконтактной химиопрофилактики;
- и) Женщинам медикам рекомендуется выполнить тест на беременность;
- к) Начать принимать в течении первых 2-х часов (но не позднее 72 часов) калетру (лопинавир/ритонавир)+комбивир (зидовудин/ламивудин) сроком на 1 месяц
- л) Наблюдаться у доверенного врача по аварийной ситуации с последующим обследованием на гепатиты, сифилис, мононуклеоз;
- м) Составить акт о несчастном случае на производстве в 3-х экземплярах;
- н) Наблюдаться у доверенного врача в течении года, обследоваться на антитела к ВИЧ раз в три месяца;
- о) Оповестить всех членов семьи об аварийной ситуации в обязательном порядке;
- п) Решить самому медработнику, говорить членам семьи об аварии или нет.

110. Каковы основные цели существующей в настоящее время антиретровирусной терапии ВИЧ-инфекции:

- а) Максимальное подавление репликации ВИЧ;
- б) Полная элиминация вируса из организма;
- в) Сохранение функции иммунной системы;
- г) Повышение качества жизни.

111. Дотестовое консультирование по ВИЧ-инфекции включает в себя:

- а) Определение наличия или отсутствия у обследуемого индивидуальных факторов риска;
- б) Возможные последствия тестирования;
- в) Оценку информированности освидетельствуемого по вопросам профилактики ВИЧ - инфекции;
- г) Предоставление информации о путях передачи ВИЧ и способах защиты от заражения ВИЧ;

- д) Предоставление информации о видах помощи доступных для инфицированного ВИЧ;
- е) Осмотр на наличие признаков заболевания.

112. В каких случаях при обследовании на ВИЧ – инфекцию в обязательном порядке проводится до и послетестовое консультирование:

- а) При обследовании на антитела к ВИЧ беременных;
- б) При обследовании на антитела к ВИЧ наркопотребителей;
- в) При обследовании на антитела к ВИЧ доноров.

113. Какие из перечисленных биологических жидкостей инфицированного имеют значение для заражения другого человека:

- а) Семенная жидкость;
- б) Моча;
- в) Грудное молоко;
- г) Кровь;
- д) Секрет влагалища;
- е) Слюна;
- ж) Слюна с примесью крови;
- з) Цервикальная жидкость.

114. При попадании биологической жидкости (крови) пациента на слизистую оболочку носа рекомендуется обработка:

- а) 1% раствором протаргола, 0,05% раствором перманганата;
- б) 2% раствором борной кислоты, 0,01% раствором перманганата;
- в) Промыть водой.

115. Кто имеет право подписывать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от медицинского вмешательства?

- А) гражданин, нуждающийся в медицинской помощи;
- Б) один из родителей;
- В) законный представитель гражданина;
- Г) медицинский работник;
- Д) все вышеперечисленные.

116. Какие виды экспертиз проводятся в соответствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ» от 21.11.2011г. №323-ФЗ?

- А) экспертиза временной нетрудоспособности;
- Б) экспертиза качества медицинской помощи;
- В) военно-врачебная экспертиза;
- Г) медико-социальная экспертиза;

- Д) экспертиза профессиональной пригодности;
- Е) экспертиза связи заболевания с профессией;
- Ж) судебно-медицинская;
- З) судебно-психиатрическая экспертиза;
- И) все вышеперечисленные.

117. На какой срок может выдать листок нетрудоспособности врач единолично?

- А) на срок не более 15 дней;
- Б) на срок не более 30 дней;
- В) на весь срок нетрудоспособности.

118. Какие формы контроля качества и безопасности медицинской деятельности определены в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ?

- А) государственный контроль;
- Б) ведомственный контроль;
- В) внутренний контроль;
- Г) все вышеперечисленные.

119. Как часто может гражданин выбирать медицинскую организацию для получения первичной медико-санитарной помощи, в том числе по территориально-участковому принципу?

- А) не чаще чем два раза в год;
- Б) не чаще чем один раз в год;
- В) не чаще одного раза в 2 года.

120. Кто имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документацией пациента, отражающей состояние его здоровья?

- А) пациент и его законный представитель;
- Б) родственники;
- Д) работодатели.

121. Каким Приказом в настоящее время утвержден порядок выдачи листков нетрудоспособности?

- А) приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011г. №624н «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности»;
- В) приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.08.2007г. №514 «О порядке выдачи медицинскими организациями листков нетрудоспособности»;
- Д) приказом ФСС РФ №18, Минздрава РФ №29 от 29.01.2004г. «Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения».

122. Каким Приказом в настоящее время утверждена форма бланка листка нетрудоспособности?

- А) приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011г. №624н «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности»;
- В) приказом Минздравсоцразвития от 26.04.2011г. №347н «Об утверждении формы бланка листка нетрудоспособности»;
- Д) приказом ФСС РФ №18, Минздрава РФ №29 от 29.01.2004г. «Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения».

123. Каким приказом утверждена Инструкция о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения?

- А) приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011г. №624н «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности»;
- В) приказом Минздравсоцразвития от 26.04.2011г. №347н «Об утверждении формы бланка листка нетрудоспособности»;
- Д) приказом ФСС РФ №18, Минздрава РФ №29 от 29.01.2004г. «Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения».

124. Укажите основные принципы охраны здоровья граждан в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

- А) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий;
- Б) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи;
- В) приоритет охраны здоровья детей;
- Г) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;
- Д) ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья;
- Е) доступность и качество медицинской помощи;
- Ж) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи;
- З) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;
- И) соблюдение врачебной тайны;
- К) всё вышеперечисленное.