

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ

для аттестации по специальности
«Анестезиология и реаниматология»
Высшая квалификационная категория

1. Назовите дату проведения первого в мире эфирного наркоза?
 - а. 16 октября 1846 года
 - б. 19 января 1847 года
 - в. 7 февраля 1847 года
2. В мире основоположницей системы ухода за пациентом считают:
 - а. Христофор фон Оппель
 - б. Даша Севастопольская
 - в. Флоренс Найтингейл
 - г. Вирджиния Хендерсон
3. Какой из указанных анестетиков является антигипоксантом?
 - а. Бриетал
 - б. Оксibuтират натрия
 - в. Диприван
4. Одноразовые изделия медицинского назначения перед утилизацией подвергают:
 - а. Ополаскиванию проточной водой
 - б. Мойке
 - в. Дезинфекции
 - г. Стерилизации
5. При каком из указанных заболеваний противопоказан наркоз тиопенталом-натрия?
 - а. Сахарный диабет
 - б. Бронхиальная астма
 - в. Гипертоническая болезнь
6. Внутрибольничная инфекция развивается только при наличии:
 - а. Источника инфекции
 - б. Источника инфекции и восприимчивого человека
 - в. Источника инфекции, факторов передачи и восприимчивого человека
 - г. Фактор передачи
7. Для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения рекомендуется проба:
 - а. Азопирамовая
 - б. Амидопириновая
 - в. Бензидиновая
 - г. Ортотолидиновая
 - д. Верно все перечисленное

8. *Аппараты ингаляционного наркоза (ИН) и искусственной вентиляции легких (ИВЛ) обсеменяются микрофлорой и могут стать фактором передачи заболеваний:*
- Респираторного тракта
 - Вирусными гепатитами
 - ВИЧ – инфекции
 - Желудочно – кишечного тракта
9. *Больному предстоит лапароскопическая холецистэктомия. Сопутствующая патология - глаукома. Можно ли для премедикации использовать атропин?*
- Нельзя. Атропин повышает внутриглазное давление
 - Можно, но только в сочетании с диазепамом
 - Ограничений для применения атропина нет
10. *Во время анестезии контроль герметичности дыхательного контура при ИВЛ должен осуществляться:*
- Врачом - анестезиологом
 - Врачом - инженером
 - Медицинской сестрой - анестезистом
11. *При выполнении оперативного вмешательства пациенту придали положение Фовлера. Какой ответ правильный?*
- Возвышенное положение головного конца
 - Головной опущен, ножной - поднят
 - Положение на спине, с валиком под поясничной областью
12. *Во время внутривенной анестезии на фоне самостоятельного дыхания воздухом у больного развилось осложнение именуемое «Синдром Мендельсона», сущность этого осложнения заключается:*
- Аспирация
 - Регургитация
 - Гиперсаливация
13. *Во время интенсивной терапии контроль давления в дыхательном контуре при ИВЛ должен осуществляться:*
- 1 раз в 60мин
 - 1 раз в 30мин
 - Непрерывно
14. *Медицинская сестра – анестезист на случай трудной интубации готовит набор, в состав которого входят:*
- Конбитьюб
 - Набор для катетеризации артерии
 - Ларингельная маска
15. *Профилактикой «синдрома нижней полой вены» в акушерстве является:*
- Срочная интубация трахеи и введение глюкокортикоидов
 - Поворот роженицы на левый бок
 - Введение спазмолитиков

16. *Волюмоспирометр при включении его в контур выдоха предназначен для измерения:*
- Объёма вдоха
 - Объёма выдоха
 - МОД
17. *С какой целью перед операцией, проводимой под общим обезболиванием, вводят М-холинолитики (атропин, метацин)?*
- Для профилактики гипотензии
 - Для достижения гемостатического эффекта
 - Для блокады периферических М-холинорецепторов и фармакологической «денервации» блуждающего нерва
18. *Ингаляционный анестетик, обладающий свойством быстрого пробуждения:*
- Фторотан
 - Дормикум
 - Севоран
19. *Какие из указанных препаратов относятся к анксиолитикам?*
- Дроперидол, тизерцин, аминазин
 - Диазепам, рогипнол, мидазолам, дормикум
 - Трамадол, просидол, бупренорфин
20. *При использовании «Дипривана»:*
- Возможна остановка дыхания
 - Возможна гипердинамия
 - Возможна фибрилляция
21. *Виды мониторинга?*
- Температурный, гипотензивный
 - Минимальный, углубленный, профилактический
 - Предсказуемый, наглядный, закрытый
22. *Во время интенсивной терапии контроль концентрации кислорода в дыхательной смеси при ИВЛ должен осуществлять:*
- Инженер
 - Медицинская сестра - анестезист
 - Врач - анестезиолог
23. *Медицинская сестра должна отмечать в анестезиологической карте показатели, характеризующие состояние больного в соответствии со стандартом минимального мониторинга через:*
- 5 мин
 - 10 мин
 - 15 мин
24. *Область использования «Клофелина» в анестезиологической практике?*
- Седация
 - Анальгезия

- в. Миоплегия
25. *Препарат, получаемый методом непрямого электрохимического окисления?*
- Барбитураты
 - Бензодиазепины
 - Этомидат
26. *Назовите эффекты ненаркотических анальгетиков:*
- Эйфория, гипотензия, брадикардия
 - Аналгезия, жаропонижающий и противовоспалительный эффекты
 - Устранение чувства тревоги, слабость
27. *Во время анестезии медицинская сестра должна измерять температуру тела:*
- В начале и по окончании операции
 - По окончании операции
 - Постоянно
28. *Клинки ларингоскопа после использования проходят следующие этапы обработки:*
- Дезинфекцию
 - Дезинфекцию + предстерилизационную очистку
 - Дезинфекцию + предстерилизационную очистку + стерилизацию
 - Предстерилизационную очистку
29. *Побочные эффекты наркотических анальгетиков:*
- Тошнота, угнетение дыхания, ригидность мышц грудной клетки
 - Кровотечения, гипертензия, гипертермия
 - Анемия, гипопроотеинемия, агранулоцитоз
30. *Пределы колебаний SAO₂ при нормальной оксигенации больного при дыхании атмосферным воздухом:*
- 85 – 90%
 - 91 – 95%
 - 96 – 100%
31. *Методы используемые с целью минимального мониторинга во время интенсивной терапии:*
- АД, ЧСС, ЭКГ
 - АД, СВ, ЧДД
 - АД, ЧСС, ЦВД
32. *Длительное время в анестезиологии для наркоза применялся эфир. Перечислите его достоинства, как анестетика:*
- Возможность применения в «полевых» условиях
 - Большая широта терапевтического действия
 - Раздражающее действие на верхние дыхательные пути
33. *Препарат «Этомидат» относится к группе:*
- Наркотических анальгетиков
 - Ингаляционных анестетиков

- в. Неингаляционный анестетик
34. Передача нервных импульсов в синапсах центральной и периферической нервной системы осуществляется с помощью медиаторов. Какие из указанных веществ относятся к медиаторам?
- Норадреналин, ацетилхолин, дофамин
 - Мезатон, адреналин, дроперидол
 - Аминазин, тизерцин,
35. Опиоидный анальгетик, обладающий наименьшим кардиодепрессивным эффектом:
- Фентанил
 - Морфин
 - Промедол
36. Генеральная уборка реанимационных залов проводится:
- 1 раз в 2 недели
 - 1 раз в неделю
 - 1 раз в 10 дней
 - 1 раз в месяц
37. Укажите дозу дитилина, применяемую для интубации трахеи у взрослых:
- 1-2мг\кг
 - 3-5мг\кг
 - 10 мг\кг
38. Медицинская сестра несет моральную ответственность за свою деятельность перед:
- Пациентом
 - Пациентом и коллегами
 - Пациентом, коллегами и обществом
39. Должностные преступления – это:
- Клевета
 - Халатность, злоупотребление служебным положением
 - Оскорбление
 - Ссоры
40. Виды взысканий за нарушения трудовой дисциплины:
- Выговор
 - Замечание
 - Увольнение
 - Все перечисленное
41. Работники предупреждаются об увольнении по сокращению численности или штата не менее чем за:
- Одну неделю
 - Две недели
 - Один месяц

- г. Два месяца
42. В минимальный размер оплаты труда премии, надбавки и доплаты
- Включаются
 - Не включаются
43. Перевод медицинской сестры для замещения отсутствующего работника осуществляется в течении календарного года на срок на более:
- Двух недель
 - Одного месяца
 - Двух месяцев
 - Трёх месяцев
44. Ночным считается время:
- С 20.00 до 05.00
 - С 20.00 до 06.00
 - С 21.00 до 06.00
 - С 22.00 до 06.00
45. Преимущества эндотрахеального наркоза:
- Обеспечивает свободную проходимость дыхательных путей, независимо от операционного положения тела
 - Надежно изолирует ЖКТ от дыхательных путей
 - Самый нетоксичный вид наркоза, т.к., благодаря применению релаксантов, доза общих анестетиков резко уменьшается
 - Все перечисленное верно
46. Медицинскому персоналу осуществлять этаназию:
- Разрешается по просьбе пациента
 - Допускается в исключительных случаях
 - Запрещается законом
47. Право граждан РФ на охрану здоровья гарантируется:
- Трудовым кодексом РФ
 - Конституцией РФ, основами законодательства об охране здоровья граждан
 - Гражданским кодексом
 - Программой развития здравоохранения
48. «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» введён в действие в:
- 1990г.
 - 1993г.
 - 1998г.
 - 2000г.
49. Охрана здоровья является задачей:
- Граждан государства
 - Медицинских работников

- в. Всего общества
 - г. Все перечисленное
50. *Планирование численности медицинского персонала учреждения осуществляется на основании:*
- а. Штатных нормативов
 - б. Наличия специалистов
 - в. Образования сотрудников
 - г. Квалификации медицинских работников
51. *Повышение квалификации медицинских кадров обязательно не менее одного раза:*
- а. В 3 года
 - б. В 5 лет
 - в. В 7 лет
 - г. В 10 лет
52. *Документ единого образца, подтверждающий соответствие подготовки специалиста образовательным стандартам, достаточной для самостоятельной профессиональной деятельности:*
- а. Лицензия
 - б. Диплом об образовании
 - в. Сертификат специалиста
 - г. Удостоверение личности
 - д. Верно все перечисленное
53. *Когда и где принят первый устав международного совета медицинских сестёр:*
- а. В Мексике – Сити в 1973г.
 - б. В Филадельфии в 1900г.
 - в. В Лондоне в 1900г.
54. *К способам дезинфекции относят:*
- а. Химический и физический
 - б. Профилактический и текущий
 - в. Погружение и орошение
55. *В каком году был принят этический кодекс международного совета медицинских сестёр:*
- а. В Лондоне в 1900г.
 - б. В Мексике – Сити в 1973г.
 - в. В Крыму в 1860г.
56. *Основную долю возбудителей ВБИ составляют:*
- а. Патогенные бактерии
 - б. Условно – патогенные бактерии
 - в. Вирусы
 - г. Грибы
57. *В каком году был принят этический кодекс медицинских сестёр России:*
- а. В 1997г.
 - б. В 1973г.

- в. В 1993г.
58. При проведении закрытого массажа сердца грудина продавливается по направлению к позвоночнику у взрослых на:
- а. 1-2см
 - б. 4-5см
 - в. 5-7см
59. Обмен информацией между двумя и более людьми – это:
- а. Доклад
 - б. Выступление
 - в. Общение (коммуникация)
60. Личная дистанция при повседневном общении медицинской сестры с пациентами, коллегами:
- а. 0 – 45см.
 - б. 45 – 120см.
 - в. 120 – 400см.
 - г. 400 – 550см.
61. Особенности использования интратрахеального пути введения лекарственных препаратов при реанимации:
- а. Интратрахеально можно вводить все препараты
 - б. Вводят все препараты, но только капельно и в двойных дозах
 - в. Вводят только адреналин и атропин, в двойных дозах, разведенных в 10мл физраствора
62. Лекарственные препараты, способные инактивировать токсические вещества:
- а. Антигипоксанты
 - б. Антидоты
 - в. Антикоагулянты
63. Какие из указанных препаратов относятся к энтеросорбентам?
- а. Полифепан, полифан, активированный уголь
 - б. Сульфат магния, хлорид кальция
 - в. Протамин сульфат, мафусол, гидроксиэтилкрахмал
64. Неотложная помощь при приступе эклампсии?
- а. Обеспечение проходимости дыхательных путей
 - б. Купирование судорожного синдрома
 - в. Введение препаратов, снижающих АД
 - г. Все перечисленное
65. Автор первого проведенного в мире эфирного наркоза:
- а. Н.И. Пирогов
 - б. Томас Мортон
 - в. Джон Уоррен
66. Недостатки фторотанового наркоза?

- a. Вызывает дозозависимую депрессию сердечно-сосудистой системы и дыхания
 - б. Обладает гепато- и нефротоксичностью
 - в. Повышает чувствительность сердца к катехоламинам
 - г. Все перечисленное верно
67. Мероприятия, направленные на уничтожение или уменьшение количества микроорганизмов в ране или в организме в целом, называются:
- a. Асептикой
 - б. Дезинфекцией
 - в. Антисептикой
 - г. Стерилизацией
68. Профилактика диффузной гипоксии при использовании закиси азота?
- a. Перед окончанием наркоза, вначале прекращается подача кислорода, а затем закиси азота
 - б. В начале прекращается подача закиси азота, а кислород подается еще не менее пяти минут
 - в. Подача закиси азота и кислорода прекращается одновременно
69. Для приготовления 1% раствора бриетала можно использовать:
- a. Стерильную воду для инъекций
 - б. Раствор глюкозы 5%
 - в. Раствор натрия хлорида 0,9%
 - г. Все перечисленное
70. Пути профилактики загрязнения воздуха операционной:
- a. Эффективная система отведения выдыхаемой пациентом газо-наркотической смеси
 - б. Применение поглотительных фильтров
 - в. Применение натронной извести
71. Для контроля качества дезинфекции:
- a. Делают смывы с различных поверхностей с последующим посевом на питательные среды
 - б. Ставят азопирамовую пробу
 - в. Ставят фенолфталеиновую пробу
 - г. Используют термовременные индикаторы
72. Целью стерилизации является уничтожение на изделиях медицинского назначения:
- a. Всех микробов и их спор
 - б. Только патогенных микробов
 - в. Только условно – патогенных микробов
 - г. И патогенных, и условно – патогенных микробов
73. Побочные эффекты применения морфина:
- a. Угнетение дыхания, тошнота, рвота
 - б. Атония кишечника, запоры

- в. Головные боли, боли в сердце
74. *Осложнения спинномозговой анестезии:*
- Головные боли, рвота, нестабильность гемодинамики
 - Депрессия дыхания, остановка кровообращения
 - Бронхоспазм, ларингоспазм
75. *Объясните значение термина «РЕАНИМАТОР»:*
- Реаниматор - это врач анестезиолог-реаниматолог, владеющий техникой интубации трахеи, ИВЛ, дефибрилляцией
 - Реаниматор - это любой врач или медсестра кардиологического отделения
 - Реаниматор - это любой человек, даже без медицинского образования, проводящий безаппаратную реанимацию при клинической смерти
76. *Наиболее часто встречающиеся ошибки при проведении дефибрилляции?*
- Длительные перерывы в проведении массажа и ИВЛ или полное отсутствие реанимационных мероприятий при подготовке дефибриллятора к работе
 - Неплотное прижатие или недостаточное увлажнение электродов
 - Нанесение разряда на фоне низковольтной фибрилляции без предварительного комплекса мероприятий, повышающих энергоресурсы миокарда
 - Все перечисленное верно
77. *Время наступления биологической смерти, если реанимация не проводилась?*
- При нормотермии через 6 минут
 - При нормотермии через 18 минут
 - При гипотермии через 10 минут
78. *Первая помощь при укусе гадюки?*
- Прижечь место укуса, наложить жгут
 - Отсасывание яда, иммобилизация конечности
 - Присыпать ранку пеплом, сделать разрез
79. *Основные причины трансфузий несовместимой крови:*
- Технические ошибки: неправильная маркировка на гемаконе, перепутывание образцов крови пациента и донора
 - Ошибки при выявлении антигенов АВО и РЕЗУС
 - Ошибки при проведении проб на совместимость
 - Все перечисленное верно
80. *Автор первого проведенного в России эфирного наркоза?*
- А. Бир
 - Н.И. Пирогов
 - Ф.И. Иноземцев
81. *Правила хранения миорелаксантов - ардуана, павуллона, тракриума?*
- Все три препарата хранят в холодильнике при температуре 2—8 градусов
 - Тракриум хранят в холодильнике, ардуан и павуллон при комнатной температуре
 - Все три препарата хранят при комнатной температуре

82. *Насыщение гемоглобина артериальной крови кислородом в норме:*
- а. 94-97%
 - б. 92-90%
 - в. 89-87%
83. *Стадии эфирного наркоза:*
- а. Возбуждение, хирургическая стадия, агональная
 - б. Стадия вводная, возбуждение, хирургическая, пробуждение
 - в. Анальгезии, хирургическая, передозировка
84. *Основные симптомы отравления ботулинтоксином:*
- а. Общая слабость, тошнота, рвота, диарея
 - б. Двоение в глазах, косоглазие, птоз верхнего века, затруднение глотания и дыхания
 - в. Подъем температуры до 38 градусов, озноб, боли в эпигастрии, расширение зрачка
85. *При оценке новорожденного по шкале Апгар – состояние считают удовлетворительным:*
- а. При сумме баллов 7-10
 - б. При сумме баллов 4-6
 - в. При сумме баллов 0-3
86. *Тройной прием Сафара включает:*
- а. Поворот головы пострадавшего набок, валик под голову, открывание рта
 - б. Закрытие рта, валик под голову, выведение нижней челюсти
 - в. Разгибание головы назад, выведение нижней челюсти, открытие рта
87. *Признаки правильности наложения артериального жгута:*
- а. Прекращение кровотечения, отсутствие пульса ниже раны, бледность кожи ниже жгута
 - б. Прекращение кровотечения, отсутствие пульса, нарастание цианоза
 - в. Уменьшение кровотечения, сохранение пульса, бледность кожи
88. *Первая помощь при тепловом ударе:*
- а. ИВЛ и непрямой массаж сердца
 - б. Поместить пострадавшего в прохладное место, холодный компресс или пузырь со льдом к голове
 - в. Подкожно кордиамин, кофеин
89. *Водный баланс пациента—это сопоставление:*
- а. Диуреза с количеством выпитой жидкости
 - б. Диуреза с количеством выпитой и введенной парентерально жидкости
 - в. Дневного количества мочи и ночного количества мочи
90. *Перечислите синонимы местного анестетика ЛИДОКАИНА:*
- а. Ксилокаин, лигнокаин

- б. Маркаин, анекаин
- в. Прокаин, новокаин

91. *Цель использования клофелина в качестве компонента анестезиологического пособия?*

- а. Устранение гемодинамических и эндокринных реакций связанных с операционной травмой
- б. Потенцирование действия анальгетиков и анестетиков
- в. Обеспечивает адекватное обезболивание в послеоперационном периоде

92. *Можно ли нейтрализовать кислоту в желудке при отравлении уксусной эссенцией щелочным раствором соды?*

- а. Обязательно, так как щелочь является антидотом кислоты
- б. Да! Только на фоне обязательного введения анальгетиков и спазмолитиков
- в. Нет! При контакте соды с кислотой образуется большое количество углекислого газа, что может привести к разрыву желудка

93. *Объясните понятие термина «Аутогемотрансфузия»:*

- а. Переливание собственной крови пациента, взятой у него заблаговременно перед операцией
- б. Обратное переливание крови в сосудистое русло больного, теряемой им в результате операции
- в. Переливание свежезаготовленной донорской крови

94. *Гематокрит – это отношение объема форменных элементов крови к объему всей крови. Укажите нормальные показатели гематокрита у мужчин и женщин:*

- а. у мужчин=40 – 48%, у женщин = 36 -39%
- б. у мужчин = 36 – 42%, у женщин = 40- 48%
- в. у мужчин и женщин этот показатель одинаковый

95. *Один круглосуточный пост м/с в ОАРИТ рассчитывается на:*

- а. 6 человек
- б. 3 человека
- в. 4 человека

96. *В условиях фторотанового наркоза у пациента возникло нарушение ритма с низким АД. При этой ситуации в лечении аритмии противопоказан препарат:*

- а. лидокаин
- б. адреналин
- в. панангин

97. *Закись азота влияет на внутричерепное давление следующим образом:*

- а. повышает
- б. снижает

в. не изменяет

98. Если в баллоне со сжиженной закисью азота количество ее уменьшится в 2 раза, то давление снизится:

- а. ровно в 2 раза
- б. не изменится вовсе
- в. менее чем в 2 раза

99. Этапы фармакокинетики:

- а. распределение
- б. всасывание
- в. биотрансформация
- г. выведение
- д. все перечисленное верно

100. Виды действия лекарственных средств:

- а. основное
- б. побочное
- в. вспомогательное

101. Наркотические лекарственные средства вызывают:

- а. пристрастие
- б. лекарственную зависимость
- в. привыкание
- г. все перечисленное

102. Обследованию на наличие антител к ВИЧ подлежат лица с:

- а. анемии различного генеза;
- б. кандидоз пищевода, трахеи, легких;
- в. половой контакт с ВИЧ – инфицированным;
- г. женщины с острым воспалением гинекологической сферы неясной этиологии;
- д. легочной или внелегочной туберкулез;
- е. бытовой контакт с ВИЧ – инфицированным.
- ж. с острой кишечной инфекцией.

103. В каких случаях возможно инфицирование медработника?

- а. укол иглой, контаминированной биологической жидкостью;
- б. попадание биологической жидкости на здоровую кожу;
- в. попадание крови на слизистую глаз, носа;
- г. участие в экстренной операции;
- д. незащищенный половой акт

104. При положительном результате на наличие антител к ВИЧ у взрослого должно быть:

- а. качественная ПЦР на вирусную нагрузку положительная;
- б. скрининговый ИФА положительный или сомнительный, референс ИФА положительный, иммунный блот положительный;
- в. скрининговый ИФА положительный, референс ИФА положительный, иммунный блот сомнительный.

105. Дотестовое консультирование по ВИЧ – инфекции предполагает:

- а. проведение консультирования медработником любой специальности;
- б. проведение консультирования только специалистами Центра по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ;
- в. получение информированного согласия на обследование в письменном виде;
- г. оказание психологической поддержки пациенту;
- д. позволяет выявить отношение данного пациента к группам риска;
- е. обучение пациента принципам безопасного поведения по отношению к ВИЧ – инфекции.
- ж. проводится при каждом обследовании на антитела к ВИЧ.

106. Что нужно сделать при несчастном случае на производстве в ЛПУ (попадание биологической жидкости пациента через поврежденные кожные покровы – порез, прокол и т.д., на слизистые оболочки медработника):

- а. Оказать себе самопомощь, используя аптечку для профилактики ВИЧ-инфекции;
- б. Сообщить представителю администрации об аварии;
- в. Уточнить данные по ВИЧ-статусу пациента или обследовать его на антитела к ВИЧ экспрестестами с последующим обследованием через лабораторию;
- г. Сообщить родственникам пациента о факте аварии;
- д. Зарегистрировать факт аварии в журнале регистрации несчастных случаев на производстве;
- е. Медработнику обследоваться на наличие антител к ВИЧ вскоре после аварии экспрестестами с последующим обследованием через лабораторию;
- ж. Обратиться к доверенному врачу по ВИЧ-инфекции с целью назначения постконтактной химиопрофилактики;
- з. Желательно в первые 2 часа (но не позднее 72 часов) начать принимать противовирусные препараты по схеме ВААРТ;
- и. Принимать калетру (лопинавир/ритонавир) + комбивир (зидовудин/ламивудин) в течение 1 месяца по схеме ВААРТ
- к. Наблюдаться у доверенного врача по аварийной ситуации с последующим обследованием на гепатиты, сифилис, мононуклеоз;
- л. Составить акт о несчастном случае на производстве в 3-х экземплярах;
- м. Наблюдаться у доверенного врача в течении года, обследоваться на антитела к ВИЧ раз в три месяца;
- н. Оповестить всех членов семьи об аварийной ситуации в обязательном порядке;
- о. Решить самому медработнику, говорить членам семьи об аварии или нет.

107. Широкое распространение вируса гепатита С у ВИЧ – инфицированных связано с:

- а. частым сочетанием туберкулеза и ВИЧ – инфекции;
- б. с парентеральным употреблением немедицинских психотропных веществ;
- в. с заражением вируса герпеса;
- г. с наличием вторичных инфекций.

108. Доноры крови обследуются на наличие антител к ВИЧ:

- а. 1 раз в шесть месяцев;
- б. 1 раз в год;
- в. при каждой сдаче крови и других биоматериалов;
- г. 1 раз в квартал;
- д. при регулярном плановом наблюдении при сдаче крови могут быть не обследованы

109. Стоимость обследования на антитела к ВИЧ для пациентов должна составлять:

- а. не более 150 рублей;
- б. бесплатно для граждан России в учреждениях государственной системы здравоохранения;
- в. только бесплатно;
- г. бесплатно в учреждениях любой формы собственности ЛПО.

110. Выберите принципы профилактики полового пути передачи ВИЧ:

- а. избегать случайных половых связей;
- б. не пользоваться услугами коммерческого секса;
- в. всегда использовать средства защиты;
- г. пользоваться услугами коммерческого секса;
- д. использовать травмирующие секс-игрушки;
- е. своевременно лечить воспалительные заболевания гинекологической сферы.

111. Назовите отличия в обслуживании заведомо ВИЧ – инфицированного пациента при проведении парентеральной процедуры:

- а. одеть маску, халат, перчатки, очки;
- б. одеть двойные латексные перчатки;
- в. одеть бахилы, сменную обувь;
- г. приготовить емкости с дез.раствором;
- д. обработать руки для проведения хирургических вмешательств;
- е. обработать ногтевые фаланги , ногтевые ложа спиртовым раствором йода из аптечки;
- ж. выполнять процедуру в присутствии старшей сестры или зав.отделением;
- з. иметь дублера на случай аварийной ситуации

