

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ
по специальности «Лечебное дело»
первая категория

1. Обследование мед.персонала на носительство золотистого стафилококка при приеме на работу и в процессе профессиональной деятельности в плановом порядке:
 - а. проводится
 - б. не проводится
 - в. проводится 2 раза в год
2. При уборке по типу текущей, дезинфекции УФО:
 - а. проводят однократно
 - б. проводят дважды
 - в. проводят трижды
 - г. не проводят
3. При травмировании пальца контаминированной иглой фельдшер должен, прежде всего:
 - а. снять перчатки
 - б. поставить в известность старшую медицинскую сестру
 - в. обработать кожу йодом
 - г. выдавить кровь и смыть
4. Продолжительность мытья рук перед любой манипуляцией:
 - а. 5 мин
 - б. 1 мин
 - в. 30 сек
 - г. 15 сек
5. Проба на качество предстерилизационной обработки:
 - а. бензидиновая
 - б. азопирамовая
 - в. бензойная
 - г. никотинамидовая
6. Дезинфекционные мероприятия в очаге в присутствии источника инфекции – это дезинфекция:
 - а. текущая очаговая
 - б. профилактическая
 - в. заключительная очаговая
 - г. генеральная
 - д. перед манипуляциями
7. Дератизация-это комплекс мероприятий, направленных на уничтожение:

- а. патогенных и условно-патогенных микроорганизмов
 - б. членистоногих - переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний
 - в. грызунов- переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний
 - г. грибов
8. Для декантамации рук перед надеванием перчаток, применяются:
- а. 96 градусный спирт
 - б. кожные антисептики
 - в. 0,5% раствор хлорамина
 - г. 1% раствор хлорамина
9. Цвет одноразовых пакетов для утилизации отходов класса Б:
- а. зеленый
 - б. белый
 - в. желтый
 - г. красный
10. Допускается ли смешивание отходов различных классов на стадии сбора, хранения, транспортировки:
- а. допускается, но не на всех стадиях
 - б. не допускается
 - в. допускается, но не всех классов
11. Один из субъектов медицинского страхования:
- а. страхователь
 - б. врач
 - в. фельдшер
 - г. страховой случай
12. Эвтаназия – это:
- а. удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти какими-либо действиями или средствами, в т.ч. прекращения искусственных мер по поддержанию жизни
 - б. наступление лёгкой, безмятежной смерти, произошедшей естественным путём
13. Реабилитация направлена на:
- а. полное восстановление социального и профессионального статуса
 - б. устранение или компенсацию ограничения жизнедеятельности
14. Школы здоровья – это:
- а. медицинская профилактическая технология, основанная на совокупности индивидуального и группового воздействия на пациентов и направленная на повышение уровня их знаний
 - б. образовательное учреждение, где учат здоровому образу жизни
15. Передача информации посредством речи называется:

- а. глобальная коммуникация
- б. невербальная коммуникация
- в. сетевая коммуникация
- г. вербальная коммуникация

16. Психологические факторы, которые способствуют выздоровлению человека, называются:

- а. факторы валеологии
- б. факторы саногенного влияния
- в. факторы психотерапии
- г. факторы восстановления

17. При длительном приеме антацидов возможны:

- а. поносы
- б. запоры

18. Сухость кожи, гиперкератоз, накопление массы, выпадение волос, гипомимия, замедление мышления, сонливость подозрительны на.

- а. гипотиреоз
- б. гипертиреоз

19. Бронхолитики занимают основное место в лечении:

- а. обструктивного бронхита
- б. гнойного бронхита

20. Угрожающим жизни осложнением острого периода пневмонии может быть:

- а. гипертермический синдром
- б. легочное кровотечение
- в. некупирующийся болевой синдром
- г. инфекционно-токсический шок

21. Впервые возникшая стенокардия напряжения диагностируется при длительности заболевания:

- а. не более одной недели
- б. не более месяца
- в. не более 3-х месяцев

22. Осложнениями гипертонического криза могут быть:

- а. острый инфаркт миокарда
- б. острое нарушение мозгового кровообращения
- в. острая сердечная недостаточность
- г. любое из перечисленных

23. Какими рекомендациями Вы бы воспользовались при составлении пищевого рациона пациенту с язвенной болезнью?

- а. частое, дробное питание
- б. механически и химически щадящее питание
- в. увеличение содержания белка в пищевом рационе

г. разгрузочные дни

24. Укажите случай одышки, которую следует назвать инспираторной:

- а. учащенное поверхностное дыхание при хронической недостаточности кровообращения
- б. затрудненный шумный вдох при стенозе гортани
- в. затрудненный вдох вследствие спазма бронхов при бронхиальной астме

25. К синдромам, характерным для сахарного диабета не относится:

- а. полиурия
- б. полидипсия
- в. полифагия
- г. уремия

26. Во избежание появления липодистрофии инсулин следует вводить в одно и то же место не чаще:

- а. чем 1 раз в 7 дней
- б. чем 1 раз в день
- в. чем 1 раз в месяц

27. Какие отделы сердца увеличиваются при артериальной гипертензии?

- а. правое предсердие, правый желудочек
- б. левое предсердие, левый желудочек

28. Основным симптомом при коллапсе:

- а. артериальная гипертензия
- б. артериальная гипотензия
- в. гипертермический синдром
- г. анурия
- д. потеря сознания

29. Термин «анурия» означает:

- а. полное отсутствие мочи или уменьшение его выделения менее 300 мл в сутки
- б. уменьшение выделения мочи менее 1,5 литров в сутки

30. Поллинозы - аллергические реакции, развитие которых связано с повышенной чувствительностью к:

- а. антибиотикам
- б. витаминам
- в. пыльце растений

31. Зубец Р характеризует:

- а. процессы работы желудочков
- б. процессы работы предсердий

32. При венозном кровотечении необходимо:

- а. наложить жгут
- б. прижать вену пальцем
- в. наложить давящую повязку
- г. наложить жгут-закрутку

33. Для отморожения 3 степени характерно:

- а. обратимое расстройство кровообращения
- б. некроз эпидермиса
- в. некроз всей толщи кожи
- г. образование пузырей со светлым содержимым

34. Для перелома трубчатой кости не характерно:

- а. усиление боли при осевой нагрузке
- б. удлинение конечности
- в. патологическая подвижность
- г. деформация конечности

35. При переломе бедра необходимо фиксировать:

- а. тазобедренный сустав
- б. тазобедренный и коленный суставы
- в. тазобедренный, голеностопный и коленный суставы
- г. место перелома

36. Оптимальное положение при напряженном пневмотораксе:

- а. лежа на больном боку
- б. на здоровом боку
- в. сидя-полусидя

37. Осложнение калькулезного холецистита:

- а. перфорация желчного пузыря
- б. острый панкреатит
- в. эмпиема желчного пузыря
- г. механическая желтуха
- д. все перечисленное верно

38. Острая кишечная непроходимость проявляется:

- а. кинжальные боли в животе
- б. ноющие боли в животе
- в. схваткообразные боли в животе

39. С целью лечения инвагинации кишечника в первые часы от начала заболевания показано:

- а. промывания желудка
- б. спазмолитики
- в. пневмоирригоскопия
- г. сифонная клизма

40. Распространенным симптомом ранней стадии рака прямой кишки является:
- а. рвота
 - б. чувство переполнения желудка после еды
 - в. дегтеобразный стул
 - г. алая кровь в стуле
41. При подозрении на острый аппендицит необходимо:
- а. дать легкое слабительное
 - б. сделать очистительную клизму
 - в. холод на живот
 - г. дать обезболивающий препарат
42. Для флегмоны характерно:
- а. разлитое гнойное воспаление клетчатки
 - б. ограниченная форма гнойного воспаления
 - в. гнойное воспаление кожи
 - г. гнойное воспаление потовых желез
43. К ранним симптомам столбняка относятся:
- а. гиперестезия, спазмы жевательной мускулатуры
 - б. клинические судороги
 - в. нарушение ритма сердца
 - г. асфиксия
44. Характерным для паранефрита является:
- а. лейкоцитурия, гематурия, протеинурия
 - б. задержка мочи
 - в. быстро нарастающие симптомы гнойной интоксикации
 - г. дизурия
45. Укажите признаки, характерные для нарушения кровообращения конечности:
- а. ограничения движений
 - б. гиперемия кожи
 - в. крепитация
 - г. отсутствие пульса на периферической артерии
46. Тошнота является признаком беременности:
- а. достоверным
 - б. вероятным
 - в. сомнительным
 - г. обязательным
47. Оптимальной является прибавка массы беременной за 1 неделю:
- а. 30 г
 - б. 50 г

- в. 300 г
- г. 700 г

48. Второй период родов начинается с момента:

- а. полного раскрытия шейки
- б. начала потужных схваток
- в. отхождения вод
- г. появления схваток через 3 минуты по 40 секунд

49. У ребенка, родившегося у матери с диабетом:

- а. необходимо исследовать кровь на сахар
- б. чаще всего бывает гипергликемия
- в. обычно выражена гипотрофия
- г. кожные покровы, как правило, бледные

50. Для угрожающего аборта характерно:

- а. кровотечение
- б. схваткообразные боли внизу живота
- в. ноющие боли внизу живота
- г. укорочение шейки матки

51. При полном разрыве матки:

- а. схватки усиливаются
- б. схватки прекращаются
- в. схватки становятся дискоординированными
- г. ребенок не страдает

52. Прерывание беременности по социальным показаниям разрешено до срока беременности:

- а. 12 недель
- б. 16 недель
- в. 22 недели
- г. 28 недель

53. Кровомазанье в менопаузе чаще всего свидетельствует о:

- а. беременности
- б. воспалении матки
- в. раке эндометрия
- г. нормальной менструации

54. К гонорее верхнего отдела половой системы женщины относится:

- а. бартолинит
- б. уретрит
- в. вульвовагинит
- г. сальпингоофорит

55. Наиболее опасное осложнение доброкачественных опухолей яичников:

- а. перекрут ножки опухоли

- б. разрыв капсулы кистомы
- в. озлокачествление
- г. нагноение

56. Эндометриоз наиболее характерен для возраста:

- а. ювенального
- б. предпубертатного
- в. репродуктивного
- г. постменопаузального

57. Факторы, предрасполагающие к развитию аллергозов, все, кроме:

- а. наследственность
- б. экссудативно-аллергический тип конституции
- в. лимфатико-гипопластический тип конституции
- г. врожденные пороки развития

58. Развитию острого стенозирующего ларинготрахеита способствуют:

- а. гиперсекреция бронхиального дерева
- б. отек подсвязочного пространства
- в. спазм гладкой мускулатуры дыхательных путей
- г. слабый кашлевой толчок

59. Оптимальное положение ребенка при судорогах:

- а. горизонтальное на ровной мягкой поверхности
- б. с возвышенным головным концом
- в. с опущенным головным концом
- г. не имеет значения

60. Поражение нервной системы при ревматизме:

- а. энцефалит
- б. менингит
- в. арахноидит
- г. хорея

61. Визуальные изменения мочи при пиелонефрите:

- а. соломенно-желтая
- б. цвета "пива"
- в. мутная с хлопьями
- г. красного цвета
- д. бесцветная прозрачная

62. Проба Манту проводится препаратом:

- а. очищенным туберкулином в стандартном разведении
- б. сухим туберкулином
- в. живой, ослабленной вакциной

г. анатоксином

63. Кости у детей представлены в основном:

- а. хрящевой тканью
- б. соединительной тканью
- в. костной тканью

64. Какова частота дыхания у грудных детей:

- а. 30-35 в минуту
- б. 25-30 в минуту
- в. 20-25 в минуту

65. Человек является источником инфекции при:

- а. малярии и холере
- б. сибирской язве
- в. бешенстве
- г. туляремии

66. Возбудителем сыпного тифа является:

- а. бактерия
- б. спирохета
- в. риккетсия
- г. вирус

67. Меловой язык характерен для:

- а. холеры
- б. малярии
- в. сибирской язвы
- г. чумы

68. Мероприятия по профилактике рахита проводятся:

- а. только в дородовом периоде
- б. только первые 3 мес. жизни ребенка
- в. только первый год жизни ребенка
- г. в дородовом периоде и первый год жизни ребенка

69. Характерным признаком кори не является:

- а. мелкоточечная сыпь
- б. пятнисто-папулезная сыпь
- в. пятна Филатова-Бельского
- г. кашель, насморк
- д. конъюнктивит

70. На прием обратился ребенок 12 лет с жалобами на частые мочеиспускания, жажду, похудение, слабость. Ваш предположительный диагноз:

- а. энурез

- б. пубертатный период
- в. сахарный диабет
- г. вегето-сосудистая дистония

71. У ребенка приступ бронхиальной астмы, какие симптомы говорят о разрешении (купировании) приступа:

- а. вялость, сонливость
- б. отхождение стекловидной мокроты
- в. учащение пульса

72. Основным клиническим симптомом разрыва барабанной перепонки:

- а. шум в ухе
- б. боли в ухе
- в. кровотечение из наружного слухового прохода

73. Основным симптомом при наличии инородного тела в трахее:

- а. сухой кашель
- б. затрудненный выдох
- в. усиление кашля при изменении положения туловища
- г. при аускультации над трахеей прослушивается звук инородного тела

74. Характер сыпи при вторичном сифилисе:

- а. розеолезная
- б. папулезная

75. Наиболее характерный симптом при чесотке:

- а. зуд в ночное время
- б. зуд на холоде
- в. зуд после стресса

76. Для снятия острого приступа глаукомы применяют:

- а. раствор пилокарпина 1%
- б. раствор атропина 0,15%
- в. раствор сульфата магнезии 25%

77. При подозрении на проникающее ранение глазного яблока:

- а. наложить монокулярную повязку
- б. закапать дезинфицирующие капли
- в. наложить стерильную бинокулярную повязку

78. При появлении светобоязни боли в глазах слезотечении после работы с электросваркой ставится диагноз:

- а. конъюнктивит
- б. термический ожог
- в. химический ожог
- г. электрофтальмия

79. Соотношение вдувания воздуха и массажа сердца, проводимые одним лицом:
- 2:30
 - 2:15
 - 2:4-6
80. Признак эффективности реанимации:
- сужение зрачков
 - уменьшение бледности
 - появление пульса во время массажа сердца
 - расширение зрачков
 - движение грудной клетки во время ИВЛ
81. Глубина прогиба грудины при массаже сердца у взрослого человека:
- 2-3 см
 - 1-2 см
 - 4-5 см
 - 7-8 см
82. Как изменяется продолжительность клинической смерти при утоплении в воде с T 12-14 градусов:
- укорачивается
 - удлинняется
 - не изменяется
83. Показания к наложению жгута:
- артериальное кровотечение
 - венозное кровотечение
 - любое кровотечение
84. Какой фазе шока соответствует такая клиника: больной тихо стонет, безучастный, глаза тусклые, кожа пепельно-серая, холодная, влажная, пульс нитевидный, частый:
- эректикальной
 - торпидной
85. Какое осложнение можно предположить у больного с колотой раной груди, если есть одышка, цианоз из раны течет пузырящаяся кровь:
- спонтанный пневмоторакс
 - открытый пневмоторакс
 - геморрагический шок
86. Антидот при отравлении ФОС (карбофос, дихлофос и т.д.):
- атропин
 - прозерин
 - метиленовый синий
 - унитиол

87. Какое положение придается больному в коме, если у него нет травмы черепа и позвоночника:
- на спине с опущенным головным концом
 - на боку, голова на подушке
 - устойчивое положение на боку без подушки
88. Доврачебная помощь в дореактивную фазу при отморожениях кистей и стоп:
- удаление пузырей
 - наложение термоизолирующей повязки
 - растирание снегом
 - футлярная новокаиновая блокада
89. В какие сроки нужно провести первичную хирургическую обработку раны больному в состоянии шока:
- сразу после поступления
 - на следующий день
 - как будет налажено переливание крови
 - сразу после выведения из шока
90. Гипогликемическое состояние при сахарном диабете развивается:
- 2-3 часа
 - 2-3 суток
 - 15-20 минут
91. В.И. - фельдшер здравпункта. Женщина 40 лет случайно прощупала в молочной железе безболезненное уплотнение размером 2х3 см. О каком заболевании Вы подумаете?
- мастит
 - мастопатия
 - рак
 - Туберкулез
92. Какая из перечисленных иммунологических проб может быть использована для скрининга на рак предстательной железы?
- АФП
 - РЭА
 - СА12,5
 - СА15,3
 - PSA
93. Хронический болевой синдром у онкологических больных наиболее часто развивается при :
- метастазах в кости

- б. метастазах в легкие
- в. раке желудка
- г. раке печени

94. Пигментное пятно имеет перечисленные ниже особенности. Какие из них заставляют заподозрить меланому?

- а. светло коричневый цвет
- б. синевато-черный цвет
- в. сохраненная структура кожи
- г. блестящая поверхность, структура кожи не прослеживается

94. Костные саркомы чаще всего локализуются в:

- а. ребрах
- б. бедренной кости
- в. костях таза
- г. позвонках

95. При подкожной инъекции угол введения иглы, направление среза:

- а. угол 5° срез вверх
- б. угол 45° срез вниз
- в. угол 45° срез вверх

96. Разница между систолическим и диастолическим давлением называется:

- а. дефицит пульса
- б. систолическое давление
- в. пульсовое давление

97. Измерение размеров женского таза производит:

- а. фельдшер ФАПа
- б. акушерка
- в. акушерка, фельдшер ФАПа

98. Рекомендуемый максимальный срок хранения вакцин в поликлинике:

- а. до следующей поставки
- б. 1 мес
- в. 6 мес
- г. 3 мес

99. Размораживание морозильного отделения холодильника нужно проводить, когда толщина слоя снега и льда на стенках достигнет:

- а. 1 см
- б. 2 см
- в. 1 мм
- г. 5 мм

100. Мойку холодильника нужно проводить не реже:

- а. двух раз в месяц
- б. раза в неделю
- в. раза в месяц
- г. раза в квартал

101. Заражение медработника при обслуживании ВИЧ – инфицированного возможно в случае:

- а) при проведении инъекций, пункций и др. манипуляций
- б) при проведении инъекций – прокол кожи через перчатку
- в) во время операций – порез руки
- г) проведение операции без травмы
- д) попадание крови на слизистую глаза, носа
- е) при проведении пальпации

102. Назовите основные характерные черты ВИЧ – инфекции:

- а) неблагоприятный исход заболевания
- б) постоянная репликация вируса в организме
- в) продолжительный субклинический период заболевания
- г) трансмиссивный путь передачи
- д) прогрессирующее снижение иммунитета
- е) короткий субклинический период заболевания
- ж) относительно благоприятный исход заболевания

103. Стандартным (скрининговым) методом диагностики ВИЧ – инфекции является:

- а) определение антител к антигенам вируса иммунодефицита (ИВ)
- б) культивирование вируса в культуре клеток
- в) определение РНК – вируса методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)
- г) определение антител к ВИЧ методом иммуноферментного анализа (ИФА)

104. Как можно назвать состояние распространения ВИЧ – инфекции в мире:

- а) эпидемия
- б) спорадическая заболеваемость
- в) пандемия.

105. Пути передачи ВИЧ – инфекции:

- а) половой
- б) вертикальной
- в) воздушно - капельный
- г) фекально – орально
- д) гемоконтактный
- е) пищевой
- ж) трансмиссивный

106. Максимальный риск инфицирования при проколе контаминированной иглой составляет:

- а) от 0,01% до 0,3%
- б) 30%
- в) 10%

107. Какие из перечисленных биологических жидкостей ВИЧ – инфицированного имеют значение для заражения другого человека:

- а) кровь
- б) мокрота с примесью крови
- в) сперма
- г) моча
- д) влагалищный секрет
- е) грудное молоко

108. Как трактовать наличие антител к ВИЧ в сыворотке крови взрослого?

- а) пациент находится в инкубационном периоде
- б) пациент защищен от возможного заражения ВИЧ
- в) пациент инфицирован ВИЧ
- г) пациент инфицирован ВИЧ, если специфичность антител подтверждена реакцией иммунного блотинга

109. Назовите отличия в обслуживании ВИЧ – инфицированного пациента при проведении парентеральной процедуры:

- а) одноразовые: маски, халат, перчатки, очки
- б) одеть двойные латексные перчатки
- в) наличие дополнительной емкости с дез. раствором максимальной концентрации
- г) дополнительно обработать руки для проведения хирургических вмешательств
- д) обработать ногтевые фаланги спиртовым раствором йода;
- е) обслуживать ВИЧ-инфицированных могут только медработники со специальной подготовкой
- ж) выполнять процедуру в присутствии дублера.

110. Что нужно сделать при несчастном случае на производстве в ЛПУ (попадание биологической жидкости пациента через поврежденные кожные покровы – порез, прокол и т.д., на слизистые оболочки медработника):

- а) Оказать себе самопомощь, используя аптечку для профилактики ВИЧ-инфекции;
- б) Сообщить представителю администрации об аварии;
- в) Уточнить данные по ВИЧ-статусу пациента или обследовать его на антитела к ВИЧ экспрестестами с последующим обследованием через лабораторию;
- г) Сообщить родственникам пациента о факте аварии;
- д) Зарегистрировать факт аварии в журнале регистрации несчастных случаев на производстве;
- е) Медработнику обследоваться на наличие антител к ВИЧ вскоре после аварии экспрестестами с последующим обследованием через лабораторию;
- ж) Обратиться к доверенному врачу по ВИЧ-инфекции с целью назначения постконтактной химиопрофилактики;
- з) Желательно в первые 2 часа (но не позднее 72 часов) начать принимать противовирусные препараты по схеме ВААРТ;
- и) Принимать калетру (лопинавир/ритонавир) + комбивир (зидовудин/ламивудин) в течение 1 месяца по схеме ВААРТ
- к) Наблюдаться у доверенного врача по аварийной ситуации с последующим обследованием на гепатиты, сифилис, мононуклеоз;
- л) Составить акт о несчастном случае на производстве в 3-х экземплярах;
- м) Наблюдаться у доверенного врача в течении года, обследоваться на антитела к ВИЧ раз в три месяца;
- н) Оповестить всех членов семьи об аварийной ситуации в обязательном порядке;
- о) Решить самому медработнику, говорить членам семьи об аварии или нет.