

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ
по специальности «Лечебное дело»
вторая категория

1. Медицинский персонал должен проходить флюорографическое обследование:
 - а. ежеквартально
 - б. 2 раза в год
 - в. 1 раз в год
 - г. раз в 2 года

2. Дератизация-это комплекс мероприятий, направленных на уничтожение:
 - а. патогенных и условно-патогенных микроорганизмов
 - б. членистоногих - переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний
 - в. грызунов- переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний
 - г. грибов

3. Свойство дезинфицирующего средства, обеспечивающее уничтожение грибов:
 - а. бактерицидное
 - б. вирулицидное
 - в. фунгицидное
 - д. бактериостатическое

4. Полное уничтожение микроорганизмов и их спор на инструментари и белье достигается при:
 - а. дезинфекции
 - б. предстерилизационной очистке
 - в. стерилизации
 - г. замачивании в 3% хлорамине

5. Асептика - это комплекс мероприятий:
 - а. по борьбе с инфекцией в ране
 - б. по дезинфекции инструментов
 - в. по профилактике попадания инфекции в рану
 - г. по стерилизации инструментов

6. Антисептика - это комплекс мероприятий:
 - а. по борьбе с инфекцией в ране
 - б. по профилактике попадания инфекций в рану
 - в. по дезинфекции инструментов
 - г. по стерилизации инструментов

7. Текущая уборка в режимных кабинетах проводится:
 - а. 1 раз в день
 - б. в течение рабочего дня

- в. перед манипуляциями
- г. в конце рабочего дня

8. При каких процедурах возможно заражение пациента:

- а. переливание крови и ее компонентов
- б. трансплантация органов и тканей
- в. введение подключичного катетера
- г. все перечисленное верно

9. Основной режим стерилизации воздушным методом:

- а. 120 гр. С - 40 мин
- б. 180 гр. С - 180 мин
- в. 200 гр. С - 40 мин
- г. 180 гр. С - 60 мин

10. Ведущий фактор передачи гнойно-септической инфекции в медицинских учреждениях:

- а. кровь
- б. инструменты
- в. предметы ухода
- г. руки персонала
- д. воздух

11. Может ли здоровый человек быть пациентом фельдшера:

- а. да
- б. нет

12. Этика – это:

- а. наука о морали
- б. наука о должностовании
- в. наука о правилах поведения в трудовом коллективе

13. Имеет ли пациент право на выбор врача и лечебного учреждения

- а. да
- б. нет

14. Основная задача гигиенического обучения и воспитания:

- а. формирование знаний, навыков и убеждений, направленных на укрепление и сохранения здоровья
- б. иммунопрофилактика
- в. формирование знаний у населения по вопросам диагностики и лечения заболеваний

15. В дословном переводе с греческого языка «Психология» означает:

- а. наука о взаимоотношениях
- б. наука об обязанностях
- в. наука о душе

г. наука о любви

16. Тип пациентов, требующих повышенного внимания к себе и к своей болезни, называется:

- а. адекватный
- б. депрессивный
- в. ипохондрический
- г. фобический
- д. истероидно-демонстративный

17. Молодой возраст, похудание, острое начало - характерны для диабета:

- а. I типа
- б. II типа

18. Влажные кожные покровы, повышенный мышечный тонус, судорожный синдром - признаки.

- а. гипогликемии
- б. гипергликемии

19. Тиреоидин, L-тироксин - гормональные препараты:

- а. щитовидной железы
- б. гипофиза

20. Дыхание пациента с бронхиальной астмой:

- а. ослабленное
- б. с удлиненным выдохом
- в. бронхиальное

21. Неприятные ощущения в грудной клетке при стенокардии локализуются:

- а. за грудиной
- б. в области верхушки сердца
- в. в любой части грудной клетки

22. При оказании скорой помощи при остром инфаркте миокарда в первую очередь надо:

- а. снять болевые ощущения за грудиной
- б. снять одышку

23. Какие мероприятия следует проводить при желудочно-кишечном кровотечении?

- а. постановка очистительной клизмы
- б. постановка сифонной клизмы
- в. промывание желудка
- г. прием пищи
- д. холод на область живота

24. Плевральную пункцию с лечебной и диагностической целью назначают пациентам:

- а. пневмонией
- б. сухим плевритом
- в. экссудативным плевритом
- г. абсцессом легкого

25. В рационе пожилых необходимо:

- а. ограничить углеводы
- б. увеличить углеводы
- в. ограничить белки

26. Что обязательно следует ограничить в питании пациентов артериальной гипертензией?

- а. сахар
- б. специи
- в. поваренную соль
- г. растительные жиры

27. Резкий подъем артериального давления называется:

- а. кризисом
- б. кризом
- в. комой
- г. коллапсом

28. «Лейкоцитурия» - характерный симптом при:

- а. гломерулонефрите
- б. пиелонефрите
- в. мочекаменной болезни

29. Термин «никтурия» означает:

- а. ночное недержание мочи
- б. преобладание ночного диуреза над дневным

30. Ушиб – это:

- а. механическое повреждение тканей или органов без видимого нарушения их целостности
- б. механическое повреждение тканей с видимым нарушением их целостности
- в. любое механическое повреждение тканей
- г. любое механическое или иное повреждение тканей

31. В качестве первой помощи при ушибах чаще всего применяется:

- а. тугие повязки на место ушиба
- б. иммобилизация места ушиба
- в. растирание обезболивающими мазями

г. холод к месту ушиба

32. Вывих – это:

- а. стойкое смещение суставных концов сочленяющихся костей
- б. нестойкое (легко устранимое) смещение суставных концов сочленяющихся костей
- в. периодически возникающее смещение суставных концов сочленяющихся костей
- г. нарушение целостности суставных концов сочленяющихся костей

33. Для артериального кровотечения характерно:

- а. истечение алой крови пульсирующей струей
- б. истечение темной крови равномерной струей
- в. истечение алой крови равномерной струей
- г. истечение темной крови пульсирующей струей

34. При повреждении плечевого сустава следует наложить повязку:

- а. циркулярную
- б. спиральную
- в. колосовидную
- г. возвращающуюся

35. При сотрясении головного мозга наиболее характерным является:

- а. кровотечение из носа
- б. потеря сознания
- в. головная боль
- г. нистагм

36. Транспортировка пациента с травмой позвоночника:

- а. на боку, на щите
- б. на животе
- в. на спине, на щите

37. Доврачебная помощь при термических ожогах 1-2 степени:

- а. местное применение мазей
- б. обмывание теплой водой
- в. обмывание пораженной части холодной водой 15-20 минут

38. Доврачебная тактика при «остром животе»:

- а. введение анальгетиков и вызов врача
- б. очистительная клизма, наблюдение
- в. не вводить медикаменты, госпитализация в хирургический стационар
- г. промывание желудка

39.Фурункул - есть воспаление:

- а. волосяного мешочка и тканей
- б. сальной железы
- в. потовой железы

40.При подозрении на острый аппендицит пациенту нельзя назначать:

- а. холод на живот
- б. голод
- в. покой
- г. клизму

41.При механической желтухе цвет стула:

- а. черный, дегтеобразный
- б. цвет "алой" крови
- в. светлый, глиноподобный
- г. обычный

42.Укажите признаки сухой гангрены:

- а. мумификация тканей, уплотнение их, потемнение, высушивание
- б. отек
- в. гнилостный запах
- г. грануляция

43.Гнойное воспаление потовых желез это:

- а. фурункул
- б. гидраденит
- в. карбункул
- г. абсцесс

44.При амбулаторном обращении пациента с фурункулом лица необходимо:

- а. вскрыть фурункул
- б. наложить повязку с ихтиолом
- в. наложить повязку с гипертоническим раствором
- г. срочно направить пациента на госпитализацию

45.Метод оказания первой помощи при переломах:

- а. асептическая повязка
- б. транспортная иммобилизация
- в. наложение жгута
- г. введение противостолбнячной сыворотки

46.Реакция влажной среды в норме:

- а. кислая
- б. нейтральная
- в. слабощелочная
- г. резкощелочная

- 47.Срок беременности, начиная с которого сердцебиение плода можно выслушать акушерским стетоскопом:
- а. 12 недель
 - б. 18 недель
 - в. 22 недели
 - г. 28 недель
- 48.Укажите характеристику легочного кровотечения:
- а. внезапное выделение темной крови полным ртом без позывов на рвоту
 - б. внезапное выделение алой, пенистой крови изо рта
 - в. внезапная рвота «кофейной гущей»
 - г. внезапное выделение алой крови с примесью «кофейной гущи»
- 49.При оказании помощи больным с признаками легочного кровотечения больной должен находиться в положении:
- а. лежа вполоборота
 - б. сидя
 - в. в любом удобном для него
 - г. лежа на спине
- 50.Наиболее высокий риск развития уродства плода возникает при заболевании беременной при сроке 13-14 недель:
- а. острым ринитом
 - б. острым трахеитом
 - в. краснухой
 - г. ветрянкой
- 51.Признаком переносимости плода является:
- а. масса 4000 г
 - б. гидроцефалия плода
 - в. широкие швы и роднички
 - г. мацерация кожи стоп и ладоней
- 52.Оптимальным средством контрацепции у молодых девушек является:
- а. ВМС
 - б. кондом
 - в. гормональные контрацептивы
 - г. норплант
- 53.Альгодисменорея - это:
- а. болезненные месячные
 - б. обильные месячные
 - в. задержка месячных

г. нерегулярные месячные

54. Возбудителем трихомониаза является:

- а. вирус
- б. бактерия
- в. простейшее
- г. грибок

55. Диспансерное наблюдение женщин с миомой матки проводят:

- а. каждые 3 месяца
- б. раз в полгода
- в. раз в год
- г. раз в три года

56. Наиболее частым видом внематочной беременности является:

- а. трубная
- б. яичниковая
- в. брюшная
- г. в рудиментарном роге

57. К мерам вторичной профилактики аллергозов не относится:

- а. борьба с курением, употреблением алкоголя
- б. ранняя диагностика заболеваний
- в. диспансеризация
- г. противорецидивная терапия

58. Путь передачи при ОРВИ:

- а. воздушно-капельный
- б. контактно-бытовой
- в. пищевой
- г. гематогенный

59. При нарушении кровообращения отеки появляются с:

- а. лица
- б. шеи
- в. груди
- г. голеней

60. Признаки ревматизма могут появиться:

- а. во время ангины
- б. сразу после ангины
- в. через 2-3 недели после ангины
- г. через 2-3 месяца после ангины

61. Гемофилия является заболеванием:

- а. инфекционным
- б. наследственным

- в. аллергическим
- г. аутоиммунным

62. Иммунопрофилактика туберкулеза новорожденным проводится:

- а. на 3-5 день
- б. на 7-8 день
- в. на 10-14 день
- г. на 28 день

63. В каком возрасте прорезываются первые зубы.

- а. 4-6 месяцев
- б. 6-7 месяцев
- в. 8-9 месяцев
- г. 10-12 месяцев

64. Какой тип дыхания у детей раннего возраста:

- а. диафрагмальный
- б. смешанный
- в. грудной

65. Каковы особенности диеты при заболеваниях сердца у детей.

- а. гипоаллергенная
- б. богатая солями калия
- в. бедная солями кальция

66. Каковы физические методы охлаждения, применяемые при розовой лихорадке:

- а. растирание полуспиртовые или полуюксусные
- б. обтирания полуспиртовые или полуюксусные
- в. обтирание теплой водой

67. Острая сосудистая недостаточность характеризуется:

- а. внезапным подъемом АД
- б. внезапным падением АД
- в. болями за грудиной
- г. головными болями

68. Выберите срок введения 1-го прикорма:

- а. 2-3 месяцев
- б. 3-4 месяцев
- в. 4-5 месяцев
- г. 6-7 месяцев

69. Укажите наиболее типичный признак пневмонии у недоношенных и гипотрофичных детей:

- а. кашель
- б. повышение температуры
- в. одышка
- г. снижение аппетита

70. Ребенок с сахарным диабетом после инъекции инсулина не поел и после физической нагрузки резкое ухудшение состояния – потеря сознания с клонико-тоническими судорогами. Ваша тактика:
- седуксен в/м
 - преднизолон в/м
 - в/в 40% или 20% глюкоза
 - кордиамин в/м
71. Реакция Манту считается отрицательной, если:
- инфильтрат до 1 мм
 - папула 5 мм
 - гиперемия 5 мм
 - папула 12 мм
 - папула 10 мм
72. Основной клинический симптом при наличии инородного тела в гортани:
- боли в горле
 - кашель с мокротой
 - удушье
73. Тактика при инородном теле носа:
- госпитализация
 - удаление инородного тела
74. Инкубационный период чесотки:
- 6 недель
 - 4 недели
 - 7 дней
75. Источник заражения микроспорией:
- собаки, кошки, мыши
 - утки, гуси
76. При тяжелой травме глаза накладывается повязка:
- на один глаз
 - бинокулярная повязка
77. При обнаружении инородного тела в полости конъюнктивы
- обезболивание
 - дезинфицирующие капли
 - удаление инородного тела тампоном
 - все перечисленное верно
78. Частота закапывания капель при остром гнойном конъюнктивите составляет:
- 1 раз в сутки
 - 3 раза в сутки
 - 4-5 раз и более
79. Максимальная продолжительность клинической смерти в обычных условиях:

- а. 5-7 мин
- б. 3-5 мин
- в. 7-8 мин
- г. 1-2 мин

80. Соотношение вдувания воздуха и массажа сердца, проводимые одним лицом:

- а. 2:30
- б. 2:15
- в. 2:4-6

81. Место приложения силы при массаже сердца:

- а. на границе средней и нижней трети грудины
- б. мечевидный отросток
- в. верхняя треть грудины
- г. граница верхней и средней трети грудины

82. При каких утоплениях показана госпитализация:

- а. при любых
- б. бессознательное состояние

83. Транспортировка больного при массивной кровопотере:

- а. лежа с опущенным головным концом
- б. полусидя
- в. лежа на боку

84. Какой фазе шока соответствует клиническая картина: больной мечется, кричит, пульс напряженный, учащенный, кожа бледная, глаза блестят:

- а. эректиальной
- б. торпидной

85. Какие симптомы говорят о пневмотороксе:

- а. одышка
- б. боль
- в. вынужденное положение тела
- г. подкожная эмфизема
- д. все ответы верны

86. При отравлении кислотами желудок промывают:

- а. водой
- б. раствором соды
- в. раствором метиленового синего

87. Первоочередные мероприятия при отравлении наркотиками и барбитуратами при остановке дыхания:

- а. введение кордиамина
- б. ИВЛ

88. Какое положение придается больному в коме, если у него нет травмы черепа и позвоночника:

- а. на спине с опущенным головным концом
- б. на боку, голова на подушке
- в. устойчивое положение на боку без подушки

89. При артериальном кровотечении жгут накладывают не более, чем на:

- а. 30 минут
- б. 60 минут
- в. 120 минут
- г. 180 минут

90. Первоочередной препарат при инфаркте миокарда:

- а. папаверин, лазикс
- б. пентамин, дибазол
- в. морфин
- г. димедрол

91. При подозрении на дифтерию мазок берется:

- а. из слизистой зева и носа
- б. только из слизистой носа
- в. только из слизистой зева

92. К факторам поражения при электротравме не относится:

- а. характеристики тока (постоянный или переменный, напряжение)
- б. время воздействия тока на организм человека
- в. состояние окружающей среды (повышенная влажность)
- г. состояние окружающей среды (повышенная или пониженная температура воздуха)

93. К признакам электроожога не относится:

- а. струпы в зоне поражения
- б. гиперемии вокруг струпа нет
- в. боль умеренная или отсутствует
- г. боль резкая нестерпимая

94. Ревакцинация взрослых по столбняку проводится

- а. ежегодно
- б. раз в 5 лет
- в. раз в 10 лет

95. Профилактика столбняка проводится:

- а. при любых ранениях
- б. только в тех случаях, когда рана или ранящий предмет имели непосредственный контакт с почвой

- в. только при укушенных ранах
- г. только при огнестрельных ранах

96. Антирабические прививки проводятся:

- а. при любых ранах
- б. только при укушенных ранах
- в. при рвано-ушибленных и укушенных ранах
- г. при укушенных и огнестрельных ранах

97. При обработке ран на доврачебном этапе необходимо:

- а. тщательно промыть раневую поверхность растворами антисептиков с помощью пульверизатора или тампона
- б. обработать только кожу вокруг раны растворами антисептиков
- в. обработать края раны растворами антисептиков, ввести в рану турунды с растворами антисептиков
- г. промыть раневую поверхность водой с мылом

98. Оральную полиомиелитную вакцину следует хранить при температуре от $+2^{\circ}\text{C}$ до $+8^{\circ}\text{C}$ на следующем уровне холодильной цепи:

- а. 1
- б. 2
- в. 3
- г. 4

99. При упаковке термоконтейнера следует обязательно использовать:

- а. упаковочный материал для предохранения вакцины от замораживания при соприкосновении с хладоэлементами
- б. лед
- в. термометры
- г. емкости с подкрашенной водой в качестве дополнительных хладоэлементов

100. В холодильной камере холодильника для хранения вакцин температура должна быть в пределах:

- а. от 0°C до $+8^{\circ}\text{C}$
- б. от $+4^{\circ}\text{C}$ до $+6^{\circ}\text{C}$
- в. от $+2^{\circ}\text{C}$ до $+8^{\circ}\text{C}$
- г. от 0°C до $+10^{\circ}\text{C}$

101. Заражение медработника при обслуживании ВИЧ – инфицированного возможно в случае:

- а) при проведении инъекций, пункций и др. манипуляций
- б) при проведении инъекций – прокол кожи через перчатку
- в) во время операций – порез руки

- г) проведение операции без травмы
- д) попадание крови на слизистую глаза, носа
- е) при проведении пальпации

102. Назовите основные характерные черты ВИЧ – инфекции:

- а) неблагоприятный исход заболевания
- б) постоянная репликация вируса в организме
- в) продолжительный субклинический период заболевания
- г) трансмиссивный путь передачи
- д) прогрессирующее снижение иммунитета
- е) короткий субклинический период заболевания
- ж) относительно благоприятный исход заболевания

103. Стандартным (скрининговым) методом диагностики ВИЧ – инфекции является:

- а) определение антител к антигенам вируса иммуноблоттинга (ИБ)
- б) культивирование вируса в культуре клеток
- в) определение РНК – вируса методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)
- г) определение антител к ВИЧ методом иммуноферментного анализа (ИФА)

104. Как можно назвать состояние распространения ВИЧ – инфекции в мире:

- а) эпидемия
- б) спорадическая заболеваемость
- в) пандемия.

105. Пути передачи ВИЧ – инфекции:

- а) половой
- б) вертикальной
- в) воздушно - капельный
- г) фекально – орально
- д) гемоконтактный
- е) пищевой
- ж) трансмиссивный

106. Максимальный риск инфицирования при проколе контаминированной иглой составляет:

- а) от 0,01% до 0,3%
- б) 30%
- в) 10%

107. Какие из перечисленных биологических жидкостей ВИЧ – инфицированного имеют значение для заражения другого человека:

- а) кровь
- б) мокрота с примесью крови
- в) сперма
- г) моча
- д) влагалищный секрет
- е) грудное молоко

108. Как трактовать наличие антител к ВИЧ в сыворотке крови взрослого?

- а) пациент находится в инкубационном периоде
- б) пациент защищен от возможного заражения ВИЧ
- в) пациент инфицирован ВИЧ
- г) пациент инфицирован ВИЧ, если специфичность антител подтверждена реакцией иммунного блотинга

109. Назовите отличия в обслуживании ВИЧ – инфицированного пациента при проведении парентеральной процедуры:

- а) одноразовые: маски, халат, перчатки, очки
- б) одеть двойные латексные перчатки
- в) наличие дополнительной емкости с дез.раствором максимальной концентрации
- г) дополнительно обработать руки для проведения хирургических вмешательств
- д) обработать ногтевые фаланги спиртовым раствором йода;
- е) обслуживать ВИЧ-инфицированных могут только медработники со специальной подготовкой
- ж) выполнять процедуру в присутствии дублера.

110. Что нужно сделать при несчастном случае на производстве в ЛПУ (попадание биологической жидкости пациента через поврежденные кожные покровы – порез, прокол и т.д., на слизистые оболочки медработника):

- а) Оказать себе самопомощь, используя аптечку для профилактики ВИЧ-инфекции;
- б) Сообщить представителю администрации об аварии;
- в) Уточнить данные по ВИЧ-статусу пациента или обследовать его на антитела к ВИЧ экспрестестами с последующим обследованием через лабораторию;
- г) Сообщить родственникам пациента о факте аварии;
- д) Зарегистрировать факт аварии в журнале регистрации несчастных случаев на производстве;
- е) Медработнику обследоваться на наличие антител к ВИЧ вскоре после аварии экспрестестами с последующим обследованием через лабораторию;
- ж) Обратиться к доверенному врачу по ВИЧ-инфекции с целью назначения постконтактной химиопрофилактики;
- з) Желательно в первые 2 часа (но не позднее 72 часов) начать принимать противовирусные препараты по схеме ВААРТ;
- и) Принимать калетру (лопинавир/ритонавир) + комбивир (зидовудин/ламивудин) в течение 1 месяца по схеме ВААРТ
- к) Наблюдаться у доверенного врача по аварийной ситуации с последующим обследованием на гепатиты, сифилис, мононуклеоз;
- л) Составить акт о несчастном случае на производстве в 3-х экземплярах;
- м) Наблюдаться у доверенного врача в течении года, обследоваться на антитела к ВИЧ раз в три месяца;
- н) Оповестить всех членов семьи об аварийной ситуации в обязательном порядке;
- о) Решить самому медработнику, говорить членам семьи об аварии или нет.