

Сестринское дело (СО) Вторая категория

1. Профессиональная медицинская ассоциация не принимает участие

- а) в проведении медико–социальной экспертизы
- б) в разработке норм медицинской этики
- в) в разработке стандартов качества медицинской помощи
- г) в лицензировании медицинской и фармацевтической деятельности

2. Основным источником медицинского права в России является

- а) федеральный закон
- б) постановление правительства рф
- в) приказ министерства здравоохранения рф
- г) постановление верховного суда рф

3. «Врачебную тайну» обязаны соблюдать

- а) все лица, которым сведения, составляющие «врачебную тайну», стали известны при исполнении профессиональных обязанностей
- б) только медицинские работники, имеющие высшее медицинское образование и свидетельство об аккредитации специалиста
- в) только медицинские и фармацевтические работники, имеющие высшее и среднее медицинское образование
- г) только должностные лица медицинской организации, имеющие свидетельство об аккредитации специалиста

4. Компетентность в деятельности медицинской сестры означает

- а) наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной профессиональной деятельности
- б) сохранение сведений о пациенте
- в) подчинение младшего старшему по должности
- г) организация образа жизни пациента, способствующая его выздоровлению

5. Страховая медицинская организация

- а) контролирует качество оказания медицинской помощи при жалобах от пациентов
- б) контролирует качество оказания медицинской помощи
- в) участвует в лицензировании медицинских организаций

г) участвует в аттестации медицинских работников

6. Полное уничтожение микроорганизмов и их спор называется

а) дезинфекцией

б) стерилизацией

в) дезинсекцией

г) демеркуризацией

7. К механическому способу дезинфекции относится

а) влажная уборка помещений

б) кипячение

в) ультрафиолетовое облучение

г) использование формалина

8. К химическому способу дезинфекции относится

а) использование дезсредства

б) генеральная уборка помещений

в) фильтрация воздуха

г) ультрафиолетовое облучение

9. К физическим факторам, действующим на микроорганизмы, относится

а) влажная уборка

б) кипячение

в) хлорная известь

г) спирт

10. Режим стерилизации в воздушном стерилизаторе

а) температура 180°С / 60 мин

б) температура 100°С / 60 ми

в) температура 120°С / 40 мин

г) температура 100°С / 40 мин

11. Первое место в структуре инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, занимают

- а) кишечные инфекции
- б) инфекции кожных покровов
- в) гнойно-септические инфекции
- г) инфекции мочевыводящих путей

12. Санитарно–противоэпидемический режим — это

- а) комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний
- б) уничтожение микроорганизмов в окружающей среде
- в) режим, который устанавливается в отделении
- г) комплекс мероприятий, направленный на выполнение дезинфекции в медицинской организации

13. Жидкое мыло для мытья рук медицинского персонала должно иметь оптимальное значение РН

- а) ph 3.5
- б) ph 5.5
- в) ph 8.5
- г) ph 10.0

14. Медицинский персонал меняет одноразовые медицинские маски

- а) после каждой манипуляции
- б) через два часа
- в) один раз в сутки
- г) через шесть часов

15. Смена постельного и нательного белья проводится один раз

- а) в месяц
- б) в 7 дней
- в) в 14 дней
- г) в 10 дней

16. Объём воды для заполнения грелки составляет

- а) 2/3 грелки

б) 1/4 грелки

в) 1/2 грелки

г) 1/3 грелки

17. Для согревания тела вода в грелке должна иметь температуру в пределах (°C)

а) 40–45

б) 20–30

в) 60–65

г) 30–35

18. При положительной азопирамовой пробе (наличие крови) появляется окрашивание

а) розовое

б) бурое

в) сине-фиолетовое

г) сине-зелёное

19. Для профилактики пролежней пациенту меняют положение тела в постели

а) каждый час

б) каждые 3 часа

в) каждые 2 часа

г) каждые 4 часа

20. При уходе за пациентом с гипсовой повязкой необходимо

а) следить за активностью пациента

б) содержать пациента в тепле

в) следить за соблюдением диеты

г) следить за кровоснабжением поврежденной конечности

21. Для разведения антибиотиков применяют

а) 0,5% раствор новокаина, 0,9% раствор натрия хлорида, вода для инъекций

б) 0,5% раствор новокаина, 10 % раствор натрия хлорида, вода для инъекций

в) 5% раствор глюкозы, 0,9% раствор натрия хлорида, вода для инъекций

г) 2% раствор новокаина, 0,9% раствор натрия хлорида, вода для инъекций

22. Отсутствие дыхания — это

- а) тахипноэ
- б) брадипноэ
- в) апноэ
- г) диспноэ

23. Увеличение частоты сердечных сокращений называется

- а) аритмией
- б) тахикардией
- в) брадикардией
- г) экстрасистолией

24. Запах ацетона изо рта характерен

- а) для гипогликемической комы
- б) для гипергликемической комы
- в) для уремии
- г) для мозговой комы

25. При постановке внутримышечной инъекции игла вводится под углом (в градусах)

- а) 30
- б) 60
- в) 45
- г) 90

26. При постановке подкожной инъекции игла вводится под углом (в градусах)

- а) 30
- б) 60
- в) 45
- г) 90

27. Ограниченное скопление гноя в тканях — это

- а) атерома
- б) флегмона
- в) абсцесс
- г) гематома

28. Интенсивное наблюдение за пациентом в критических ситуациях включает

- а) выявление проблем пациента
- б) мониторинг жизненно важных функций
- в) выполнение мероприятий гигиенического ухода
- г) определение основных биохимических показателей крови

29. Восстановление или компенсация нарушенных функций и трудоспособности человека называется

- а) профилактикой
- б) лечением
- в) диагностикой
- г) реабилитацией

30. Для госпитальных штаммов развития ВБИ характерна

- а) высокая чувствительность к антибактериальным средствам
- б) устойчивость к антибактериальным средствам
- в) высокая чувствительность к дезинфицирующим средствам
- г) устойчивость к УФ

31. К наружному способу введения лекарственных средств относится

- а) через прямую кишку
- б) под язык
- в) подкожно
- г) в глаз

32. К списку «А» относятся лекарственные вещества

- а) дорогостоящие
- б) ядовитые

- в) снотворные
- г) гипотензивные

33. К списку «Б» относятся лекарственные вещества

- а) наркотические
- б) гипотензивные
- в) снотворные
- г) сильнодействующие

34. При появлении симптомов гипогликемии можно выполнить всё, кроме

- а) съесть 1-2 конфеты
- б) выпить стакан воды с 2-3 ст.л. сахара
- в) 1-2 чашки молока с печеньем
- г) немедленно ввести инсулин

35. Дезинфекция — это

- а) уничтожение патогенных микроорганизмов
- б) комплекс мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды
- в) уничтожение грибков
- г) уничтожение вирусов

36. Отходы от лекарственных препаратов и дезсредств с истёкшим сроком годности относятся к классу

- а) класс б
- б) класс в
- в) класс г
- г) класс д

37. Стерильный стол накрывают

- а) на сутки
- б) на 12 часов
- в) на 2 часа

г) на 6 часов

38. Опасное легочное кровотечение возникает при

- а) бронхопневмонии
- б) бронхиальной астме
- в) туберкулезе легких
- г) остром бронхите

39. Боль за грудиной, иррадиирующая в левую руку и левую лопатку – признак

- а) приступа стенокардии
- б) желчной колики
- в) почечной колики
- г) приступа бронхиальной астмы

40. Приступ стенокардии купируют

- а) парацетамолом
- б) нитроглицерином
- в) папаверином
- г) морфином

41. Показатели АД 145/95 мм рт. ст. – это

- а) экстрасистолия
- б) гипертензия
- в) гипотензия
- г) норма

42. Инфекция, связанная с оказанием медицинской помощи (ИСМП), развивается только при наличии

- а) источника инфекции
- б) источника инфекции и восприимчивого человека
- в) источника инфекции, факторов передачи, восприимчивого человека
- г) факторов передачи, восприимчивого человека

43. При острой сосудистой недостаточности (обморок, коллапс) больному надо

придать положение

- а) ровное горизонтальное
- б) горизонтальное с приподнятой головой
- в) полусидячее
- г) горизонтальное с приподнятыми ногами

44. Для профилактики аспирации рвотных масс больному следует придать положение

- а) на спине
- б) на боку
- в) на животе
- г) полусидячее

45. Стремительно развивающийся шок

- а) травматический
- б) геморрагический
- в) анафилактический
- г) ожоговый

46. К абсолютным признакам переломов костей относится

- а) ограничение движений в суставах
- б) боль
- в) патологическая подвижность кости
- г) наличие гематомы

47. Признак артериального кровотечения

- а) наличие гематомы
- б) медленное вытекание крови из раны
- в) темно-вишнёвый цвет крови
- г) сильная пульсирующая струя крови

48. Показание к наложению жгута

- а) венозное кровотечение

- б) кровотечение в просвет полого органа
- в) внутреннее кровотечение
- г) артериальное кровотечение

49. Главный признак вывиха

- а) боль
- б) изменение формы сустава
- в) невозможность движения в суставе
- г) отёк сустава

50. Эпилептический припадок характеризуется

- а) редким дыханием, бледной кожей
- б) отсутствием или резким ослаблением реакции организма на внешние раздражители
- в) внезапной потерей сознания
- г) запахом ацетона изо рта

51. Для удушья характерны

- а) сильная головная боль
- б) сильный кашель, синюшность и отёчность лица
- в) беспокойство, потливость, дрожь
- г) боли в сердце

52. Первая помощь при гипогликемической предкоме

- а) срочно ввести инсулин
- б) дать пару кусков сахара, конфету, кусок хлеба
- в) срочно доставить в лечебное учреждение
- г) сделать непрямой массаж сердца

53. Неотложная помощь при носовом кровотечении

- а) запрокинуть голову больного назад, положить холод на переносицу, сделать тампонаду
- б) нагнуть голову больного вперёд, положить холод на переносицу, сделать тампонаду
- в) немедленно уложить больного на спину без подушки, положить холод на переносицу, сделать тампонаду

г) приложить тепло к переносице

54. Принципы оказания неотложной помощи при тяжёлой электротравме

а) начать сердечно-лёгочную реанимацию и, по возможности, принять меры для удаления пострадавшего от источника тока

б) освободить пострадавшего от контакта с источником тока, соблюдая меры личной предосторожности, и только после этого начать сердечно-лёгочную реанимацию

в) закопать пострадавшего в землю

г) облить пострадавшего водой

55. Артериальный жгут накладывают максимум на

а) 1-1,5 часа

б) 0,5-1 час

в) 2-3 часа

г) 1-2 часа

56. Что не относится к формам острых аллергических реакций

а) отёк квинке

б) крапивница

в) анафилактический шок

г) снижение температуры тела

57. Доврачебная помощь при отморожении

а) погружение в горячую воду

б) наложение термоизолирующей повязки

в) растирание снегом и шерстью

г) наложение масляно-бальзамической повязки

58. Во время коллапса кожные покровы

а) бледные, сухие, теплые

б) бледные, влажные, прохладные

в) гиперемированные, сухие

г) гиперемированные, влажные

59. Частота искусственных вдохов при ИВЛ у взрослых должна быть

- а) 12-16 в минуту
- б) 4-5 в минуту
- в) 15-20 в минуту
- г) 20 -30 в минуту

60. Медицинская помощь в первую очередь оказывается

- а) пострадавшим с повреждениями несовместимым с жизнью
- б) легко пострадавшим
- в) пострадавшим с повреждениями с нарастающими расстройствами жизненных функций
- г) женщинам и детям

61. Обязательным условием при проведении непрямого массажа сердца является

- а) наличие марлевой салфетки для дыхания рот в рот
- б) наличие валика под лопатками
- в) наличие двух реанимирующих
- г) наличие твердой поверхности

62. Первая медицинская помощь при ранении наружной сонной артерии

- а) наложение давящей воздухо непроницаемой повязки
- б) пальцевое прижатие
- в) прошивание раны
- г) обезболивание

63. Цель сестринского процесса

- а) диагностика и лечение заболевания
- б) обеспечение приемлемого качества жизни в период болезни
- в) решение вопроса об очередности мероприятий ухода
- г) активное сотрудничество с пациентом

64. При подозрении на перитонит необходимо

- а) ввести антибиотик и положить грелку на живот
- б) ввести обезболивающее и госпитализировать

- в) дать холод на живот и госпитализировать
- г) сделать очистительную клизму и промывание желудка

65. При гематоме кровь скапливается в

- а) полости сустава
- б) мягких тканях
- в) плевральной полости
- г) околосердечной сумке

66. Повязку "Дезо" используют при переломе

- а) костей предплечья
- б) грудины
- в) ключиц
- г) рёбер

67. При переломе нижней челюсти необходима повязка

- а) косыночная
- б) пращевидная
- в) 8-образная
- г) крестообразная

68. К твёрдым повязкам относится

- а) бинтовая
- б) гипсовая
- в) клеевая
- г) давящая

69. Действия медицинской сестры при обнаружении повязки, пропитанной кровью, начинаются с

- а) подбинтования повязки
- б) измерения АД
- в) вызова врача
- г) введения викасола

70. Проводить бритьё кожи перед плановой операцией следует

- а) на операционном столе
- б) за сутки до операции
- в) вечером накануне операции
- г) утром до операции

71. Предоперационный период начинается с

- а) начала подготовки к операции
- б) установления диагноза
- в) момента поступления в хирургический стационар
- г) начала заболевания

72. Разница между количеством систол и пульсовых волн называется

- а) экстрасистолией
- б) брадикардией
- в) дефицитом пульса
- г) асистолией

73. Появление внеочередной пульсовой волны меньшей величины называется

- а) экстрасистолией
- б) брадикардией
- в) дефицитом пульса
- г) асистолией

74. Отсутствие пульса называется

- а) асистолией
- б) брадикардия
- в) экстрасистолия
- г) тахикардия

75. Учащение пульса называется

- а) экстрасистолия
- б) тахикардия

в) брадикардия

г) асистолией

76. Число сердечных сокращений у взрослого человека в норме (ударов в минуту)

а) 85-90

б) 40-60

в) 80-100

г) 60-80

77. Пульс – это колебания стенки артерий, создающиеся

а) систолической волной крови

б) диастолической волной крови

в) правильным чередованием сильных пульсовых волн с паузами

г) давлением крови

78. У здорового человека сахар в моче

а) 1%

б) 5%

в) отсутствует

г) 0,5%

79. Независимое сестринское вмешательство при болях в суставах

а) ввести обезболивающее

б) придать удобное положение в постели

в) ввести противовоспалительные средства

г) провести тепловые процедуры

80. Признак воздушной эмболии

а) внезапное повышение АД

б) приступ удушья

в) судороги

г) повышение температуры тела

81. Сестринский диагноз

- а) не отличается от врачебного
- б) может изменяться в течение суток
- в) определяет болезнь
- г) имеет цель вылечить

82. Субъективным методом сестринского обследования является

- а) определение отеков
- б) расспрос пациента
- в) измерение артериального давления
- г) знакомство с данными медицинской карты

83. Определение сестринского диагноза

- а) выявление клинического синдрома
- б) описание проблем пациента, связанных с реакциями на заболевание
- в) выявление причины заболевания
- г) выявление конкретного заболевания

84. Задержки стула - это проблема

- а) второстепенная
- б) потенциальная
- в) эмоциональная
- г) настоящая

85. К независимым сестринским вмешательствам относится

- а) использование газоотводной трубки
- б) организация взаимопомощи в семье пациента
- в) назначение горчичников
- г) назначение лечебного стола и режима двигательной активности

86. Слово "диагноз" в переводе с греческого языка означает

- а) болезнь
- б) распознавание
- в) признак

г) состояние

87. Третий этап сестринского процесса включает

- а) планирование объема сестринских вмешательств
- б) срочное оказание неотложной помощи
- в) выявление проблем пациента
- г) сбор информации

88. Понятие жизненно важная потребность человека означает

- а) способность функционировать независимо
- б) дефицит того, что существенно для здоровья и благополучия человека
- в) любое осознанное желание
- г) потребность человека в самоактуализации

89. Не является методом стерилизации

- а) воздушный
- б) кипячение
- в) химический
- г) паровой

90. В течение какого времени производят раздачу готовой пищи после ее приготовления

- а) 3 часа
- б) 2 часа
- в) 30 минут
- г) 6 часов

91. Угол наклона иглы по отношению к коже при внутривенной инъекции равен

- а) 90 градусов – перпендикулярно
- б) 60 градусов – острый
- в) 5 градусов – почти параллельно
- г) 45 градусов - острый

92. Больным с отеками, одышкой при заболеваниях сердца разрешают принимать в

пищу

- а) поваренную соль
- б) кофе, крепкий чай
- в) продукты, богатые клетчаткой
- г) жидкость

93. Куда нельзя вводить гепарин

- а) под кожу передней брюшной стенки
- б) внутримышечно
- в) внутривенно капельно
- г) внутривенно струйно

94. Основной метод лабораторной диагностики, позволяющий установить возбудителя в материале больного

- а) бактериологический
- б) серологический
- в) кожно-аллергологический
- г) аллергологический

95. Специфическая профилактика гриппа

- а) антигистамины
- б) жаропонижающие
- в) антибиотики
- г) прививки

96. Плевральную пункцию проводят с целью

- а) разъединение плевральных сращений
- б) отсасывание мокроты из бронхов
- в) уменьшение болевого синдрома
- г) удаление жидкости с плевральной полости

97. Скопление жидкости в брюшной полости - это

- а) гидроперикардит

- б) асцит
- в) гидроторакс
- г) анасарка

98. Медицинская сестра может определить наличие наружных отеков у пациента методом

- а) пальпации кистей рук
- б) пальпации голеней
- в) измерения суточного диуреза
- г) пальпации живота

99. Скопление жидкости в плевральной полости - это

- а) гидроторакс
- б) анасарка
- в) гидроперикардит
- г) асцит

100. Разность между систолическим и диастолическим артериальным давлением называется

- а) дефицитом пульса
- б) пульсовым давлением
- в) минимальным артериальным давлением
- г) максимальным артериальным давлением

101. Инспираторную одышку характеризует

- а) кашель с большим количеством пенистой мокроты
- б) затруднение на вдохе
- в) затруднение на выдохе
- г) затруднение на вдохе и выдохе

102. Какая форма медицинского страхования принята в РФ

- а) по законченному случаю
- б) персональное

в) обязательное

г) пенсионное

103. Важнейшая задача сестринского процесса

а) установить диагноз заболевания

б) назначение лечения

в) профессиональный уход с учетом медико-санитарных потребностей пациента

г) уточнение причины заболевания

104. К должностным обязанностям медсестры не относится

а) санитарно-просветительная работа

б) уход за пациентом

в) раздача медикаментов

г) назначение лечения

105. Выберите правильное определение: "Совокупность норм поведения медика и их регулирование в лечебном процессе - это

а) санитарно-просветительная работа"

б) сестринский процесс"

в) сестринское дело"

г) медицинская этика"

106. Медицинская деонтология – это наука

а) о морали поведения

б) о формах человеческого сознания

в) о должном

г) о профессиональном долге медицинских работников

107. Этический кодекс медсестры в России принят

а) всемирной организацией здравоохранения

б) министерством здравоохранения и социального развития рф

в) международным советом медсестер

г) ассоциацией медицинских сестёр россии

108. Медицинская сестра несет моральную ответственность за свою деятельность перед

- а) пациентом и коллегами
- б) пациентом, коллегами и обществом
- в) пациентом и обществом
- г) коллегами и обществом

109. Профилактические медицинские осмотры являются основой

- а) первичной медико-санитарной помощи
- б) диспансеризации
- в) реабилитации
- г) экспертизы трудоспособности

110. Палатная медсестра при поступлении пациента

- а) проводит диагностику
- б) срочно вызывает врача
- в) осуществляет переливание крови
- г) знакомит его с режимом

111. Выберите состояние, при котором необходимо провести процедуру промывания желудка

- а) химические ожоги пищевода кислотами
- б) острое отравление большими дозами лекарственных препаратов
- в) инфаркт миокарда
- г) желудочное кровотечение

112. Ведущая причина артериальной гипертензии у лиц пожилого и старческого возраста

- а) ожирение
- б) атеросклероз
- в) острый гломерулонефрит
- г) хронический гломерулонефрит

113. Задержка мочеиспускания у лиц пожилого и старческого возраста часто связана

с

- а) острым гломерулонефритом
- б) острым пиелонефритом
- в) острым циститом
- г) аденомой предстательной железы

114. Метод ранней диагностики туберкулеза легких

- а) бронхография
- б) спирография
- в) томография
- г) флюорография

115. При приеме препаратов железа кал окрашивается в цвет

- а) белый
- б) жёлтый
- в) красный
- г) чёрный

116. Первичная хирургическая обработка раны пострадавшему в состоянии шока проводится

- а) сразу после поступления
- б) после введения антибиотиков
- в) сразу после выведения из шока
- г) после переливания крови

117. Баллон с кислородом окрашен

- а) в серый цвет
- б) в белый цвет
- в) в голубой цвет
- г) в чёрный цвет

118. Баллон с закисью азота окрашен

- а) в белый цвет

- б) в серый цвет
- в) в черный цвет
- г) в голубой цвет

119. В каком положении проводится пальпация щитовидной железы

- а) лёжа на кушетке
- б) в положении стоя в покое, слегка наклонив голову вниз
- в) сидя на стуле, запрокинув голову назад
- г) лёжа на боку

120. Журнал регистрации пациентов, поступающих в лечебное отделение ведет

- а) старшая медицинская сестра
- б) процедурная медицинская сестра
- в) постовая медицинская сестра
- г) врач

121. Заражение медработника при обслуживании ВИЧ – инфицированного возможно в случае:

- а) при проведении инъекций, пункций и др. манипуляций
- б) при проведении инъекций – прокол кожи через перчатку, во время операций – порез руки
- в) попадание крови на слизистую глаз, носа или рта
- г) верны ответы б, в

122. Назовите основные характерные черты ВИЧ – инфекции:

- а) неблагоприятный исход заболевания, постоянная репликация вируса в организме, продолжительный субклинический период заболевания
- б) короткий субклинический период заболевания, относительно благоприятный исход заболевания
- в) прогрессирующее снижение иммунитета
- г) верны ответы а, в

123. Пути передачи ВИЧ - инфекции

- а) контактно- бытовой, воздушно-капельный

- б) алиментарный, контактный
- в) половой, парентеральный, вертикальный
- г) фекально - оральный, половой

124. При уколе, порезе необходимо:

- а) снять перчатки, промыть руки под проточной водой, место укола смазать йодом
- б) снять перчатки, промыть руки под проточной водой, заклеить бактерицидным лейкопластырем
- в) снять перчатки, промыть руки под проточной водой, выдавить из ранки 2-3 капли крови, обработать йодом, заклеить бактерицидным лейкопластырем
- г) снять перчатки, вымыть руки с мылом под проточной водой, обработать руки 70% этиловым спиртом, место прокола обработать 5% спиртовым раствором йода, заклеить бактерицидным лейкопластырем

125. Регламентирующие документы, определяющие работу МО по ВИЧ/СПИД

- а) Федеральный закон РФ от 30.03.1995г. № 38-ФЗ
- б) Санитарные правила СП 3.1.5.2826-10 от 11.01.2011 с изменениями от 21.07.2016 № 95
- в) Приказ МЗ РФ от 09.01. 2018г. № 1н
- г) Всё перечисленное верно

126. Максимальный риск инфицирования при проколе контаминированной иглой составляет:

- а) от 0,01% до 0,3%
- б) 30%
- в) 10%
- г) 2%

127. Чаще подвержены риску медработники, соприкасающиеся с:

- а) кровью и её компонентами, вагинальным секретом
- б) моча, кал, слюна, грудное молоко
- в) спермой, спинномозговой жидкостью
- г) верны ответы а, в

128. При попадании крови на халат, одежду необходимо:

- а) снять халат и сдать в стирку

б) снять халат, свернуть загрязнённой стороной в внутрь, замочить в дез. растворе, выдержать экспозицию, сдать в стирку, кожу под халатом обработать 70% этиловым спиртом

в) продолжить работать, в конце дня халат сменить

г) снять халат, положить в жёлтый пакет для отходов класса Б

129. Назовите отличия в обслуживании ВИЧ – инфицированного пациента при проведении парентеральной процедуры:

а) одноразовые: маски, халат, перчатки, очки|

б) одеть двойные латексные перчатки, обработать ногтевые фаланги спиртовым раствором йода, выполнять процедуру в присутствии дублера

в) дополнительно обработать руки для проведения хирургических вмешательств

г) обслуживать ВИЧ - инфицированных могут только медработники со специальной подготовкой

130. Содержимое укладки для профилактики парентеральных инфекций:

а) 5% спиртовой раствор йода, ватные шарики, спирт этиловый 95%, бинт марлевый стерильный

б) 1% раствор марганцовокислого калия, 5% спиртовой раствор йода, спирт этиловый 70%, лейкопластырь, протаргол, запасные перчатки, бинт, ватные шарики

в) спирт этиловый 70%, нашатырный спирт, сульфацил натрия 20%

г) спирт этиловый 70%, 5% спиртовой раствор йода, салфетки марлевые стерильные, бактерицидный лейкопластырь, бинт марлевый стерильный