

Наркология (СО) Вторая категория

1. Прогрессиентность алкоголизма оценивается по:

- а) скорости нарастания изменений личности
- б) длительности запоев
- в) длительности ремиссий
- г) длительности периода от начала систематического пьянства до формирования алкогольного абстинентного синдрома

2. По медицинским показаниям наркотики назначают:

- а) онкологическим пациентам
- б) терапевтическим пациентам
- в) стоматологическим пациентам
- г) наркологическим пациентам

3. К конечной стадии течения наркомании относится все перечисленное, кроме:

- а) кахексии
- б) полной дегградации личности
- в) абстиненции
- г) повышения толерантности

4. При проведении предрейсового медицинского осмотра медицинские работники заполняют:

- а) протокол контроля трезвости
- б) акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения
- в) протокол медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения
- г) справка о состоянии освидетельствования

5. Полинаркомания – это:

- а) одновременное злоупотребление несколькими наркотическими веществами
- б) повышение дозы наркотического вещества
- в) алкоголизм в сочетании с наркоманией
- г) употребление сильнодействующих препаратов

6. Для первой стадии алкоголизма характерны все перечисленные симптомы, кроме:

- а) утраты количественного и ситуационного контроля
- б) роста толерантности
- в) амнезии отдельных периодов опьянения
- г) абстинентного синдрома

7. Для первой стадии алкоголизма наиболее характерна форма злоупотребления алкоголя в виде:

- а) постоянного пьянства на фоне повышенной толерантности
- б) коротких двух-трех дневных псевдозапоев
- в) частых однодневных эксцессов
- г) перемежающего пьянства

8. В третьей стадии алкоголизма наиболее часто встречаются следующие формы злоупотребления алкоголем:

- а) постоянное пьянство с высокой толерантностью
- б) истинные запои
- в) псевдозапои
- г) постоянное пьянство с низкой толерантностью

9. Для средней степени алкогольного опьянения характерно все перечисленное, кроме:

- а) нарушения речи
- б) нарушения походки
- в) неустойчивости в позе Ромберга
- г) слабого запаха алкоголя изо рта

10. Для тяжелой степени алкогольного опьянения характерно все перечисленное, кроме:

- а) нарушения сознания, ориентировки
- б) нарушения походки
- в) неточности выполнения точных движений
- г) дрожания век, языка, пальцев рук

11. Для алкогольной комы характерно все перечисленное, кроме:

- а) нарушение сознания
- б) сужение зрачков
- в) снижение рефлексов
- г) повышение температуры

12. Остаточные явления предшествующего алкогольного опьянения коррелируют с концентрацией алкоголя в крови:

- а) 0,022 - 1%
- б) 1 - 2%
- в) 2 - 3%
- г) 3 - 4%

13. Нерезко выраженные признаки абстинентного синдрома наблюдаются при употреблении:

- а) опиатов
- б) препаратов конопли
- в) стимуляторов
- г) барбитуратов

14. Реабилитация больных наркоманией предусматривает:

- а) организацию условий для полноценного комплексного поддерживающего лечения больных
- б) психологический тренинг
- в) социальную помощь
- г) все перечисленное верно

15. Основные признаки коматозного состояния:

- а) падение гемодинамики
- б) угнетение дыхания
- в) потеря мышечного тонуса
- г) угнетение центральной нервной системы (ЦНС)

16. Глубина комы определяется по степени угнетения:

- а) дыхания
- б) рефлексов
- в) гемодинамики
- г) сознания

17. Состояние глоточного рефлекса при коме 2 степени:

- а) сохранен
- б) снижен
- в) отсутствует
- г) усилен

18. ЛСД относится к:

- а) психостимуляторам
- б) производным конопли
- в) галлюциногенам
- г) опиатам

19. Для абстиненции при употреблении опиатов характерны все перечисленные симптомы, кроме:

- а) зуда в носу, чихания
- б) нарушения сна
- в) боли в суставах и мышцах
- г) сужения зрачков

20. Для абстиненции при употреблении каннабиноида характерно все перечисленное, кроме:

- а) неприятных ощущений в сердце
- б) снижения настроения
- в) артериальной гипертензии
- г) тремора

21. Из перечисленных факторов в группу высокого риска формирования наркоманий у подростков относят все, исключая:

- а) алкоголизм, наркомании у родителей, ближайших родственников

- б) наличие хронических соматических заболеваний
- в) патологические формы поведения
- г) социально неблагопалучные семьи

22. Кустарно изготовленный первитин относится к:

- а) опиатам
- б) психостимуляторам
- в) галлюциногенам
- г) транквилизаторам

23. Кокаин относится к:

- а) седативным средствам
- б) психостимуляторам
- в) галлюциногенам
- г) препаратам конопли

24. Метадон является:

- а) нейролептиком
- б) психостимулятором
- в) опийным производным
- г) сильнодействующим веществом

25. Сужение зрачков характерно для:

- а) эфедроновой интоксикации
- б) опийного абстинентного синдрома
- в) гашишной интоксикации
- г) опийной интоксикации

26. Для абстиненции при употреблении наркотиков стимулирующего ряда характерно все выше перечисленное, кроме:

- а) ощущения разбитости
- б) сонливости днем, бессонницы ночью
- в) психотических эпизодов

г) ломающих болей в суставах и мышцах

27. Основными клиническими проявлениями алкогольной депрессии являются все перечисленное, кроме:

а) снижения настроения

б) чувства тоски и тревоги

в) идей самообвинения и самоуничтожения

г) бреда ревности

28. Для алкогольного бреда ревности характерно все выше перечисленное, кроме:

а) бреда преследования

б) идеи отношения

в) тревоги

г) тактильных галлюцинации

29. Основными признаками алкогольного галлюциноза являются:

а) помрачение сознания

б) полная амнезия психоза

в) преобладание вербальных псевдогаллюцинаций

г) преобладание истинных вербальных галлюцинаций

30. Судорожные припадки в абстинентном синдроме характерны для:

а) опийной наркомании

б) гашишной наркомании

в) эфедроновой наркомании

г) барбитуровой наркомании

31. Уголовная ответственность за изготовление, хранение и сбыт наркотиков предусмотрена статья УК РФ:

а) 119

б) 167

в) 228

г) 235

32. Характерными признаками при употреблении седативных препаратов являются

все перечисленное, кроме:

- а) бледности кожных покровов
- б) зрительных галлюцинации
- в) снижения тонуса мышц и рефлексов
- г) смазанности речи

33. К классу веществ, способных вызывать зависимость, относят все перечисленные, кроме:

- а) группы амфетамина и других психостимуляторов
- б) веществ седативного действия
- в) нейролептических средств
- г) галлюциногенных веществ

34. Результаты предрейсового медицинского осмотра заносятся в:

- а) журнал контроля трезвости
- б) протокол осмотра водителя автотранспортного средства
- в) путевой лист
- г) протокол медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения

35. Штамп в путевом листе водителей ставится при:

- а) допуске к работе
- б) наличии признаков употребления алкоголя
- в) наличии у водителей симптомов острого заболевания
- г) наличии признаков употребления наркотиков

36. Журнал регистрации предрейсовых, предсменных медицинских осмотров, и Журнал регистрации послерейсовых, послесменных медицинских осмотров:

- а) пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью организации и заверены подписью руководителя
- б) заверены только подписью медицинского работника, проводящего предрейсовый медицинский осмотр
- в) только пронумерованы
- г) заверены только подписью руководителя организации

37. При опьянении, вызванном употреблением наркотических или сильнодействующих веществ, выявляется все перечисленное, кроме:

- а) наличия следов инъекций
- б) акроцианоза, гипергидроза
- в) нистагма
- г) запаха алкоголя изо рта

38. Лица отказывающийся от диспансерного наблюдения:

- а) привлекаются к уголовной ответственности
- б) привлекаются к принудительному лечению
- в) к ответственности не привлекаются
- г) направляются на лечение в психиатрические больницы

39. О распространенности алкоголизма наиболее эффективно свидетельствует следующий показатель:

- а) рождаемость
- б) смертность
- в) количество абсолютного алкоголя, потребляемого на душу населения в год
- г) количество состоящих на учете больных

40. Максимальное угнетение дыхательного центра после внутривенного введения морфина развивается через:

- а) 1-3 минуты
- б) 5-10 минут
- в) 15-20 минут
- г) 30 минут

41. Поражение периферической нервной системы при алкоголизме проявляется:

- а) полинейропатией
- б) рассеянным склерозом
- в) параличами
- г) парезами

42. Наркологическая помощь наркологическим больным оказывается по:

- а) просьбе больного
- б) просьбе и с согласия родителей или других законных представителей больного
- в) требованию общественных организаций по месту жительства больного
- г) требованию правоохранительных органов

43. В настоящее время для наркоманий характерны все перечисленные тенденции, исключая:

- а) появление новых форм наркотиков
- б) рост числа женщин, злоупотребляющих наркотиками
- в) склонность к комбинированному приему наркотиков
- г) преимущественное употребление средств растительного происхождения

44. Современное состояние проблемы наркоманий отражает:

- а) увеличение числа больных среди молодежи и женщин
- б) изменение мотивов потребления наркотиков - для удовлетворения любопытства
- в) ответ 1
- г) ответ 1,2

45. Отпуск наркотических средств, психотропных веществ физическим лицам регламентируется:

- а) правилами внутреннего распорядка в ЛПУ
- б) Указами Президента Российской Федерации
- в) Федеральным законом Российской Федерации о наркотических средствах и психотропных веществах
- г) уголовным кодексом

46. С юридической точки зрения «производство» и «изготовление» наркотических средств – это:

- а) синонимы
- б) разные понятия
- в) оборот наркотических средств
- г) реализация наркотических средств

47. Под изготовлением наркотических средств подразумевается действия, направленные на:

- а) серийное получение наркотических средств
- б) получение готовых к использованию и потреблению наркотических средств
- в) культивирование растительного сырья для дальнейшего изготовления наркотических средств
- г) изготовление психотропных препаратов

48. Наиболее часто психозы развиваются при употреблении:

- а) препаратов конопли
- б) опиатов
- в) ингалянтов
- г) бензодиазепинов

49. Следы внутривенных инъекций обнаруживаются при употреблении:

- а) барбитуратов
- б) галлюциногенов
- в) стимуляторов
- г) антипаркинсонических препаратов

50. Максимальная толерантность к алкоголю развивается при алкоголизме:

- а) в первой стадии заболевания
- б) во второй стадии заболевания
- в) в третьей стадии заболевания
- г) в состоянии алкогольной абстиненции

51. Соматические изменения в III стадии алкоголизма:

- а) отсутствуют
- б) носят характер функциональных нарушений
- в) носят необратимый характер
- г) носят характер вегетативных расстройств

52. Ранним называется алкоголизм, формирующийся в период:

- а) до 25 лет
- б) до 18 лет

в) внутриутробного развития

г) 6–7 лет

53. Эфедрон чаще всего употребляется:

а) внутривенно

б) внутримышечно

в) путем курения

г) путем ингаляции

54. Алкогольная деградация личности проявляется:

а) ослаблением памяти и утратой критики

б) разноплановостью мышления

в) морально-этическим снижением

г) эмоциональной амбивалентностью

55. Для легкой степени алкогольного опьянения характерно:

а) нарушение поведения

б) нарушение сознания и ориентировки

в) нарушение походки

г) тремор

56. Осложненная наркомания – это сочетание зависимости от наркотиков и:

а) антибиотиков

б) алкоголя

в) глюкокортикоидов

г) витаминных препаратов

57. Какой из перечисленных методов является наиболее эффективным для преодоления анозогнозии:

а) гипноз

б) медикаментозная терапия

в) рациональная психотерапия

г) иглорефлексотерапия

58. Социальные последствия наркологических заболеваний проявляются в:

- а) способности выполнять в полном объеме семейные и производственные обязанности
- б) выраженном профессиональном снижении с утратой прежней квалификации
- в) иждивенческих тенденциях
- г) деградации личности

59. Клиническими проявлениями наркомании при употреблении препаратов стимулирующего ряда являются:

- а) приподнятое настроение
- б) повышение работоспособности
- в) болтливость
- г) острые бредовые состояния

60. Токсикомания – это заболевание, обусловленное употреблением:

- а) химических токсических веществ
- б) психотропных препаратов
- в) алкоголя
- г) наркотиков

61. Для интоксикации опиоидными наркотиками характерно:

- а) бледность кожи
- б) покраснение кожи
- в) сужение зрачков
- г) расширение зрачков

62. Клиническими признаками кокаиновой наркомании являются:

- а) повышение интеллектуальной деятельности
- б) расширение зрачков, блеск глаз
- в) тактильные галлюцинации
- г) эпилептические припадки

63. Алкоголь в организме в основном всасывается в:

- а) желудке

- б) двенадцатиперстной кишке
- в) толстом кишечнике
- г) тощей кишке

64. Основными признаками алкогольного параноида являются:

- а) галлюцинаторные расстройства
- б) чувственный аффект страха
- в) бред преследования
- г) психические автоматизмы

65. Расширение зрачков характерно для:

- а) эфедроновой интоксикации
- б) барбитуровой интоксикации
- в) опийного абстинентного синдрома
- г) опийной интоксикации

66. Какой из перечисленных методов является наиболее эффективным для преодоления анозогнозии:

- а) гипноз
- б) медикаментозная терапия
- в) рациональная психотерапия
- г) иглорефлексотерапия

67. Основными клиническими признаками делирия являются:

- а) бред преследования
- б) стереотипные автоматизированные действия
- в) слуховые галлюцинации
- г) ложные узнавания

68. Клиническими проявлениями наркомании при употреблении галлюциногенов являются:

- а) зрительные галлюцинации
- б) страх, подозрительность

- в) бредовые идеи преследования
- г) параличи нижних конечностей

69. Повторное медицинское освидетельствование проводится по:

- а) личному заявлению водителя
- б) направлению руководителя автотранспортного предприятия
- в) направлению медицинского работника
- г) направлению сотрудников ГИБДД

70. К метаболитам алкоголя относятся:

- а) ацетальдегид
- б) молочная кислота
- в) уксусная кислота
- г) масляная кислота

71. Характерными признаками интоксикации при употреблении кетамина являются:

- а) психомоторное возбуждение
- б) зрительные и слуховые галлюцинации
- в) нарушение речи
- г) потеря способности запоминать текущие события

72. Для вынесения заключения о факте употребления наркотического вещества обязательным является:

- а) заявление испытуемого об употреблении наркотического вещества
- б) обнаружение наркотического вещества в биологических средах организма
- в) представление врачу сведений об употреблении испытуемым наркотического вещества
- г) выявление клиники опьянения (одурманивания), вызванного употреблением наркотических веществ

73. Для проведения лабораторных исследований биологических сред на содержание алкоголя используются:

- а) алкометры
- б) газовые хроматографы

в) метод Раппопорта

г) тест-полоски

74. Медицинская профилактика наркологических заболеваний, реализуемых через системы, кроме:

а) внутриведомственного взаимодействия

б) клинической психологии

в) межведомственного взаимодействия

г) наркологической службы

75. Медицинские работники автотранспортных предприятий осуществляют:

а) контроль за состоянием здоровья водителей

б) анализ причин отстранения водителей от работы

в) участие в служебном расследовании дорожно-транспортных происшествий (ДТП)

г) проведение медицинских осмотров водителей

76. Переход от эпизодического к систематическому злоупотреблению алкоголем проявляется в:

а) учащении периодов опьянения

б) изменении характера опьянения

в) традиционно обусловленных эпизодах употребления алкоголя

г) росте толерантности к алкоголю

77. Симптомы, характерные для употребления летучих органических соединений (бензин, толуол, бензол, ацетон и т.д.):

а) сужение зрачков

б) тахикардия

в) нарушение координации движений

г) дезориентировка

78. В неизменном виде алкоголь выводится из организма:

а) печенью

б) легкими

в) почками

г) молочными железами

79. Начальный этап лечения алкоголизма предусматривает:

- а) выработку условного рефлекса отвращения к алкоголю
- б) прерывание злоупотребления алкоголем
- в) устранение абстинентного синдрома
- г) снижение признаков возбудимости

80. Основные симптомы Корсаковского психоза:

- а) полиневриты
- б) амнезия
- в) конфабуляции
- г) сохранность памяти

81. Для второй стадии алкоголизма наиболее характерны следующие признаки:

- а) физическая и психическая зависимость от алкоголя
- б) алкогольный абстинентный синдром
- в) высокая толерантность к алкоголю
- г) алкогольная деградация личности

82. Алкоголизм – это хроническое заболевание, характеризующееся:

- а) прогрессивным течением
- б) отсутствием патологического влечения к алкоголю
- в) формированием абстинентного синдрома
- г) развитием стойких соматических, неврологических расстройств и деградацией личности

83. К синдромам помрачения сознания могут быть отнесены следующие:

- а) оглушение
- б) делирий
- в) онейроид
- г) психоорганический синдром

84. Первичная профилактика охватывает:

- а) все группы населения
- б) несовершеннолетних
- в) только молодых людей
- г) все ответы верны

85. Основными задачами предрейсовых медицинских осмотров являются выявление у водителей:

- а) признаков употребления алкоголя
- б) признаков употребления наркотических средств
- в) наличие у водителей симптомов острого заболевания или обострения хронического заболевания
- г) признаков употребления сильнодействующих веществ

86. Предрейсовые медицинские осмотры проводятся:

- а) врачами
- б) фельдшерами
- в) медицинскими сестрами
- г) все варианты верны

87. В кабинеты экспертизы опьянения после проведения предрейсового медицинского осмотра водители направляются в случаях:

- а) противоречивости данных клинического и лабораторного исследования
- б) согласия водителя с заключением проведенного контроля трезвости
- в) неясной или неполной клинической картины опьянения
- г) сомнительных результатов лабораторного исследования

88. В «группу риска» входят водители:

- а) склонные к употреблению психоактивных веществ
- б) длительно и часто болеющие
- в) старше 40 лет
- г) старше 55 лет

89. Для водителей «группы риска» проводятся медицинские осмотры:

- а) предрейсовые

- б) текущие
- в) послерейсовые
- г) еженедельные

90. К обороту наркотических средств относятся:

- а) культивирование растений, содержащих наркотические вещества естественного происхождения
- б) производство и изготовление наркотических средств
- в) хранение, перевозка и пересылка наркотических средств
- г) пропаганда употребления наркотиков

91. К основным принципам антиалкогольной терапии относятся:

- а) непрерывность и длительность
- б) комплексность
- в) максимальная индивидуальность
- г) принудительность

92. Клинические проявления алкогольного абстинентного синдрома:

- а) тремор, потливость
- б) влечение к опохмелению
- в) сухость кожи
- г) повышение аппетита

93. Мероприятия вторичной профилактики специалисты наркологической службы проводят:

- а) стационарно
- б) амбулаторно
- в) в рамках социологического опроса
- г) консультативно

94. К клиническим проявлениям наркомании при употреблении препаратов конопли относят:

- а) ощущение легкости движений
- б) психомоторное возбуждение

- в) расстройство сознания, бред, галлюцинации
- г) благодушие, расслабленность

95. Основными симптомами алкогольного делирия являются:

- а) аффективные расстройства
- б) зрительные и слуховые галлюцинации
- в) бред преследования
- г) зрительные и слуховые псевдогаллюцинации

96. Основные симптомы энцефалопатии Гайе-Вернике:

- а) нарушение сознания
- б) психотические расстройства
- в) гиперкинезы
- г) отсутствие неврологических расстройств

97. При химико-токсикологических исследованиях для определения наркотических или сильнодействующих веществ в биологических средах организма используют:

- а) тест-полоски
- б) газожидкостную и тонкослойную хроматографию
- в) иммуноферментный анализ
- г) алкометры

98. Помещение для проведения предрейсовых медицинских осмотров должно иметь:

- а) мебель (кушетка медицинская, письменный стол, стол и т.д.)
- б) электрокардиограф
- в) приборы для определения алкоголя в биологических средах организма
- г) тест-полоски

99. Гарантированный объем помощи больным наркоманией включает:

- а) обследование
- б) диагностику
- в) стационарное лечение
- г) санаторное лечение

100. Отчетные формы наркологических учреждений и подразделений

- а) фф 1,30
- б) фф 37,11
- в) фф 36,10
- г) фф 36,30

101. Что нужно сделать при несчастном случае на производстве в ЛПУ (попадание биологической жидкости пациента через поврежденные кожные покровы – порез, прокол и т.д., на слизистые оболочки медработника):

- а) Оказать себе самопомощь, используя аптечку для профилактики ВИЧ-инфекции
- б) Сообщить представителю администрации об аварии
- в) Уточнить данные по ВИЧ-статусу пациента или обследовать его на антитела к ВИЧ экспрестестами с последующим обследованием через лабораторию
- г) Сообщить родственникам пациента о факте аварии

102. Пробы сыворотки, до момента доставки в лабораторию, могут храниться в ЛПУ (вакутейнеры без компонентов, стеклянные пробирки):

- а) до 1 суток при температуре +4 +8 градусов С
- б) в течение 5 суток при температуре +4 +8градусов С
- в) до 7 суток при температуре +4 +8 градусов С
- г) несколько месяцев при температуре +4 +8 градусов С

103. Показания к амбулаторному лечению больных алкоголизмом:

- а) начальная форма болезни
- б) выраженная абстиненция
- в) неотложное состояние
- г) активное противоалкогольное лечение

104. Действия медработника в случае попадания крови на слизистую носа:

- а) промыть 2% раствором марганцевого кислого калия
- б) промыть слизистую 2 % р-ром протаргола
- в) промыть слизистую большим количеством воды из под крана, или емкости в аптечке
- г) промыть слизистую перекисью водорода

105. К симптомам расстройства восприятия относятся:

- а) бред
- б) иллюзии
- в) эйфория
- г) страхи

106. Симптом расстройства эмоций:

- а) амнезия
- б) кома
- в) эйфория
- г) оглушение

107. Функция койки - это:

- а) среднее число дней работы койки в году
- б) число больных лечившихся на койке за год
- в) число больных поступивших в стационар в данном году
- г) среднее число поступивших в стационар в данном году

108. Больной наркоманией может быть снят с учета после лечения при условии воздержания от употребления наркотиков:

- а) 1 год
- б) 5 лет
- в) 3 года
- г) 4 года

109. Какой документ выдается при нетрудоспособности возникающей вследствие алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения:

- а) справка
- б) лист нетрудоспособности не выдается
- в) справка на 3 дня, затем листок нетрудоспособности
- г) листок нетрудоспособности с отметкой о состоянии опьянения в истории болезни и в листке нетрудоспособности

110. Понятие рецидив при алкогольной зависимости включает в себя все

перечисленное, кроме:

- а) возобновление алкоголизации вследствие актуализации первичного влечения к алкоголю
- б) употребление алкоголя не повлекшее за собой развитие болезненных симптомов
- в) употребление алкоголя с целью улучшения своего психического состояния
- г) возобновление алкоголизации вследствие кампульсивного влечения к алкоголю

111. Из всех соматических осложнений при алкоголизме наиболее специфичными являются:

- а) сосудистая гипертензия
- б) панкреатит
- в) жировая дистрофия печени
- г) гастрит

112. В кабинете анонимного лечения:

- а) на обратившегося документация не заводится
- б) документация заводится по усмотрению обратившегося
- в) заводится амбулаторная карта без указания фамилии и адреса обратившегося
- г) используются все формы регистрации

113. Клинико-экспертная комиссия наркодиспансеров решает следующие задачи:

- а) направление больных на медико-социальную экспертизу
- б) экспертизы алкогольного или наркотического опьянения;
- в) диагностики в сложных случаях.
- г) лечебно-диагностической работы

114. Целью санитарно-просветительной работы в стационаре является:

- а) формирование трезвеннической установки на период лечения;
- б) формирование установки на дозированное (контролируемое) потребление алкоголя;
- в) пропаганда здорового образа жизни;
- г) формирование установки на отказ от алкоголя навсегда.

115. Динамику изготовления и потребления алкоголя в мире отражают данные:

- а) ВОЗ о производстве алкоголя на душу населения в мире
- б) о потреблении алкоголя на душу населения в мире
- в) о потреблении алкоголя населением конкретного региона
- г) о потреблении алкоголя на душу населения в отдельном регионе

116. Уголовная ответственность предусматривается кроме:

- а) нарушение установленных правил производства, хранения, отпуска, перевозок наркотических лекарственных средств
- б) незаконное изготовление, сбыт, хранение наркотических средств
- в) употребление или приобретение ПАВ без врачебного предписания
- г) содержание притонов для потребления наркотиков, склонение несовершеннолетних к употреблению наркотических средств

117. Современные тенденции, характерные для наркоманий, включают:

- а) преимущественное употребление средств растительного происхождения;
- б) появление новых форм наркотиков;
- в) исключительно парентеральный путь введения;
- г) уменьшение числа женщин, злоупотребляющих наркотиками.

118. К наркотическим препаратам относятся:

- а) содержащие спирт
- б) галлюциногены
- в) препараты валерианы
- г) этанол

119. При отравлении барбитуратами не наблюдается :

- а) возбуждение
- б) депрессия дыхания
- в) снижение рефлексов
- г) артериальная гипотензия

120. Характеристика термина "наркотическое средство" включает следующие критерии:

- а) медицинский
- б) социальный
- в) юридический
- г) все перечисленные

121. Заражение медработника при обслуживании ВИЧ – инфицированного возможно в случае:

- а) при проведении инъекций, пункций и др. манипуляций
- б) при проведении инъекций – прокол кожи через перчатку, во время операций – порез руки
- в) попадание крови на слизистую глаз, носа или рта
- г) верны ответы б, в

122. Назовите основные характерные черты ВИЧ – инфекции:

- а) неблагоприятный исход заболевания, постоянная репликация вируса в организме, продолжительный субклинический период заболевания
- б) короткий субклинический период заболевания, относительно благоприятный исход заболевания
- в) прогрессирующее снижение иммунитета
- г) верны ответы а, в

123. Пути передачи ВИЧ - инфекции

- а) контактно- бытовой, воздушно-капельный
- б) алиментарный, контактный
- в) половой, парентеральный, вертикальный
- г) фекально - оральный, половой

124. При уколе, порезе необходимо:

- а) снять перчатки, промыть руки под проточной водой, место укола смазать йодом
- б) снять перчатки, промыть руки под проточной водой, заклеить бактерицидным лейкопластырем
- в) снять перчатки, промыть руки под проточной водой, выдавить из ранки 2-3 капли крови, обработать йодом, заклеить бактерицидным лейкопластырем
- г) снять перчатки, вымыть руки с мылом под проточной водой, обработать руки 70% этиловым спиртом, место прокола обработать 5% спиртовым раствором йода, заклеить

бактерицидным лейкопластырем

125. Регламентирующие документы, определяющие работу МО по ВИЧ/СПИД

- а) Федеральный закон РФ от 30.03.1995г. № 38-ФЗ
- б) Санитарные правила СП 3.1.5.2826-10 от 11.01.2011 с изменениями от 21.07.2016 № 95
- в) Приказ МЗ РФ от 09.01. 2018г. № 1н
- г) Всё перечисленное верно

126. Максимальный риск инфицирования при проколе контаминированной иглой составляет:

- а) от 0,01% до 0,3%
- б) 30%
- в) 10%
- г) 2%

127. Чаще подвержены риску медработники, соприкасающиеся с:

- а) кровью и её компонентами, вагинальным секретом
- б) моча, кал, слюна, грудное молоко
- в) спермой, спинномозговой жидкостью
- г) верны ответы а, в

128. При попадании крови на халат, одежду необходимо:

- а) снять халат и сдать в стирку
- б) снять халат, свернуть загрязнённой стороной в внутрь, замочить в дез. растворе, выдержать экспозицию, сдать в стирку, кожу под халатом обработать 70% этиловым спиртом
- в) продолжить работать, в конце дня халат сменить
- г) снять халат, положить в жёлтый пакет для отходов класса Б

129. Назовите отличия в обслуживании ВИЧ – инфицированного пациента при проведении парентеральной процедуры:

- а) одноразовые: маски, халат, перчатки, очки|
- б) одеть двойные латексные перчатки, обработать ногтевые фаланги спиртовым раствором йода, выполнять процедуру в присутствии дублера
- в) дополнительно обработать руки для проведения хирургических вмешательств

г) обслуживать ВИЧ - инфицированных могут только медработники со специальной подготовкой

130. Содержимое укладки для профилактики парентеральных инфекций:

а) 5% спиртовой раствор йода, ватные шарики, спирт этиловый 95%, бинт марлевый стерильный

б) 1% раствор марганцовокислого калия, 5% спиртовой раствор йода, спирт этиловый 70%, лейкопластырь, протаргол, запасные перчатки, бинт, ватные шарики

в) спирт этиловый 70%, нашатырный спирт, сульфацил натрия 20%

г) спирт этиловый 70%, 5% спиртовой раствор йода, салфетки марлевые стерильные, бактерицидный лейкопластырь, бинт марлевый стерильный