

## **Наркология (СО) Высшая категория**

**1. Врач-психиатр-нарколог (врач-психиатр-нарколог участковый) осуществляет статистический учет на основании сведений, содержащихся в учетных формах:**

- а) 025-5/у-88
- б) 030-1/у-02
- в) 001/у
- г) 063/у

**2. Сведения о диспансерном наблюдении вносятся в Медицинскую карту амбулаторного наркологического больного:**

- а) 025-5/у-88
- б) 030-1/у-02
- в) 001/у
- г) 063/у

**3. Решение о прекращении диспансерного наблюдения принимается врачом-психиатром-наркологом (врачом-психиатром-наркологом участковым) в случае:**

- а) смерти пациента
- б) изменения пациентом постоянного места жительства с выездом за пределы обслуживаемой медицинской организацией территории
- в) письменного отказа пациента от диспансерного наблюдения
- г) все ответы верны

**4. Прогрессиентность алкоголизма оценивается по:**

- а) скорости нарастания изменений личности
- б) длительности запоев
- в) длительности ремиссий
- г) длительности периода от начала систематического пьянства до формирования алкогольного абстинентного синдрома

**5. По медицинским показаниям наркотики назначают:**

- а) онкологическим пациентам
- б) терапевтическим пациентам
- в) стоматологическим пациентам

г) наркологическим пациентам

**6. К конечной стадии течения наркомании относится все перечисленное, кроме:**

а) кахексии

б) полной деградации личности

в) абстиненции

г) повышения толерантности

**7. При проведении предрейсового медицинского осмотра медицинские работники заполняют:**

а) протокол контроля трезвости

б) акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения

в) протокол медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения

г) справка о состоянии освидетельствования

**8. Полинаркомания – это:**

а) одновременное злоупотребление несколькими наркотическими веществами

б) повышение дозы наркотического вещества

в) алкоголизм в сочетании с наркоманией

г) употребление сильнодействующих препаратов

**9. Для первой стадии алкоголизма характерны все перечисленные симптомы, кроме:**

а) утраты количественного и ситуационного контроля

б) роста толерантности

в) амнезии отдельных периодов опьянения

г) абстинентного синдрома

**10. Для первой стадии алкоголизма наиболее характерна форма злоупотребления алкоголем в виде:**

а) постоянного пьянства на фоне повышенной толерантности

б) коротких двух-трех дневных псевдозапоев

в) частых однодневных эксцессов

г) перемежающегося пьянства

**11. В третьей стадии алкоголизма наиболее часто встречаются следующие формы злоупотребления алкоголем:**

- а) постоянное пьянство с высокой толерантностью
- б) истинные запои
- в) псевдозапои
- г) постоянное пьянство с низкой толерантностью

**12. Для средней степени алкогольного опьянения характерно все перечисленное, кроме:**

- а) нарушения речи
- б) нарушения походки
- в) неустойчивости в позе Ромберга
- г) слабого запаха алкоголя изо рта

**13. Для тяжелой степени алкогольного опьянения характерно все перечисленное, кроме:**

- а) нарушения сознания, ориентировки
- б) нарушения походки
- в) неточности выполнения точных движений
- г) дрожания век, языка, пальцев рук

**14. Для алкогольной комы характерно все перечисленное, кроме:**

- а) нарушение сознания
- б) сужение зрачков
- в) снижение рефлексов
- г) повышение температуры

**15. Остаточные явления предшествующего алкогольного опьянения коррелируют с концентрацией алкоголя в крови:**

- а) 0,022 - 1%
- б) 1 - 2%
- в) 2 - 3%
- г) 3 - 4%

**16. Нерезко выраженные признаки абстинентного синдрома наблюдаются при**

**употреблении:**

- а) опиатов
- б) препаратов конопли
- в) стимуляторов
- г) барбитуратов

**17. При опиийной наркомании абстинентные явления возникают:**

- а) при первой стадии заболевания
- б) при второй стадии заболевания
- в) при третьей стадии заболевания
- г) все ответы верны

**18. Основные признаки коматозного состояния:**

- а) падение гемодинамики
- б) угнетение дыхания
- в) потеря мышечного тонуса
- г) угнетение центральной нервной системы (ЦНС)

**19. Глубина комы определяется по степени угнетения:**

- а) дыхания
- б) рефлексов
- в) гемодинамики
- г) сознания

**20. Состояние глоточного рефлекса при коме 2 степени:**

- а) сохранен
- б) снижен
- в) отсутствует
- г) усилен

**21. ЛСД относится к:**

- а) психостимуляторам
- б) производным конопли

в) галлюциногенам

г) опиатам

**22. Для абстиненции при употреблении опиатов характерны все перечисленные симптомы, кроме:**

а) зуда в носу, чихания

б) нарушения сна

в) боли в суставах и мышцах

г) сужения зрачков

**23. Для абстиненции при употреблении каннабиноидов характерно все перечисленное, кроме:**

а) неприятных ощущений в сердце

б) снижения настроения

в) артериальной гипертензии

г) тремора

**24. Антагонист наркотиков опиоидного ряда является:**

а) налоксон

б) кофеин

в) седуксен

г) метадон

**25. Кустарно изготовленный первитин относится к:**

а) опиатам

б) психостимуляторам

в) галлюциногенам

г) транквилизаторам

**26. Кокаин относится к:**

а) седативным средствам

б) психостимуляторам

в) галлюциногенам

г) препаратам конопли

**27. Метадон является:**

а) нейролептиком

б) психостимулятором

в) опиальным производным

г) сильнодействующим веществом

**28. Сужение зрачков характерно для:**

а) эфедроновой интоксикации

б) опиального абстинентного синдрома

в) гашишной интоксикации

г) опиальной интоксикации

**29. Для абстиненции при употреблении наркотиков стимулирующего ряда характерно все выше перечисленное, кроме:**

а) ощущения разбитости

б) сонливости днем, бессонницы ночью

в) психотических эпизодов

г) ломающих болей в суставах и мышцах

**30. Основными клиническими проявлениями алкогольной депрессии являются все перечисленное, кроме:**

а) снижения настроения

б) чувства тоски и тревоги

в) идей самообвинения и самоуничтожения

г) бреда ревности

**31. Для алкогольного бреда ревности характерно все выше перечисленное, кроме:**

а) бреда преследования

б) идеи отношения

в) тревоги

г) тактильных галлюцинации

**32. Основными признаками алкогольного галлюциноза являются:**

- а) помрачение сознания
- б) полная амнезия психоза
- в) преобладание вербальных псевдогаллюцинаций
- г) преобладание истинных вербальных галлюцинаций

**33. Судорожные припадки в абстинентном синдроме характерны для:**

- а) опийной наркомании
- б) гашишной наркомании
- в) эфедроновой наркомании
- г) барбитуровой наркомании

**34. Уголовная ответственность за изготовление, хранение и сбыт наркотиков предусмотрена статья УК РФ:**

- а) 119
- б) 167
- в) 228
- г) 235

**35. Характерными признаками при употреблении седативных препаратов являются все перечисленное, кроме:**

- а) бледности кожных покровов
- б) зрительных галлюцинации
- в) снижения тонуса мышц и рефлексов
- г) смазанности речи

**36. Целью информационно-образовательной работы в стационаре является:**

- а) формирование трезвеннической установки на период лечения
- б) Пропаганда вреда алкоголя
- в) Пропаганда здорового образа жизни
- г) Формирование установки на отказ от алкоголя навсегда

**37. Результаты предрейсового медицинского осмотра заносятся в:**

- а) журнал контроля трезвости
- б) протокол осмотра водителя автотранспортного средства
- в) путевой лист
- г) протокол медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения

**38. Штамп в путевом листе водителей ставится при:**

- а) допуске к работе
- б) наличии признаков употребления алкоголя
- в) наличии у водителей симптомов острого заболевания
- г) наличии признаков употребления наркотиков

**39. Журнал регистрации предрейсовых, предсменных медицинских осмотров, и Журнал регистрации послерейсовых, послесменных медицинских осмотров:**

- а) пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью организации и заверены подписью руководителя
- б) заверены только подписью медицинского работника, проводящего предрейсовый медицинский осмотр
- в) только пронумерованы
- г) заверены только подписью руководителя организации

**40. При опьянении, вызванном употреблением наркотических или сильнодействующих веществ, выявляется все перечисленное, кроме:**

- а) наличия следов инъекций
- б) акроцианоза, гипергидроза
- в) нистагма
- г) запаха алкоголя изо рта

**41. Лица отказывающийся от диспансерного наблюдения:**

- а) привлекаются к уголовной ответственности
- б) привлекаются к принудительному лечению
- в) к ответственности не привлекаются
- г) направляются на лечение в психиатрические больницы

**42. О распространенности пьянства и алкоголизма наиболее эффективно**



**свидетельствует следующий показатель:**

- а) рождаемость
- б) смертность
- в) количество абсолютного алкоголя, потребляемого на душу населения в год
- г) количество состоящих на учете больных

**43. Максимальное угнетение дыхательного центра после внутривенного введения морфина развивается через:**

- а) 1-3 минуты
- б) 5-10 минут
- в) 15-20 минут
- г) 30 минут

**44. Поражение периферической нервной системы при алкоголизме проявляется:**

- а) полинейропатией
- б) рассеянным склерозом
- в) параличами
- г) парезами

**45. Наркологическая помощь наркологическим больным оказывается по:**

- а) просьбе больного
- б) просьбе и с согласия родителей или других законных представителей больного
- в) требованию общественных организаций по месту жительства больного
- г) требованию правоохранительных органов

**46. Биологические особенности женщин, влияющих на возникновение у них алкоголизма:**

- а) наследственность
- б) ранняя психическая травматизация
- в) вялотекущие эндогенные заболевания
- г) все ответы верны

**47. В задачи наркологии входит:**

- а) изучение этиологии и патогенеза алкоголизма, наркоманий и токсикоманий
- б) поиск наиболее эффективных приёмов и методов профилактики и лечения
- в) анализ распространённости наркологических заболеваний, организация наркологической помощи населению
- г) все ответы верны

**48. Отпуск наркотических средств, психотропных веществ физическим лицам регламентируется:**

- а) правилами внутреннего распорядка в ЛПУ
- б) Указами Президента Российской Федерации
- в) Федеральным законом Российской Федерации о наркотических средствах и психотропных веществах
- г) уголовным кодексом

**49. С юридической точки зрения «производство» и «изготовление» наркотических средств – это:**

- а) синонимы
- б) разные понятия
- в) оборот наркотических средств
- г) реализация наркотических средств

**50. Под изготовлением наркотических средств подразумевается действия, направленные на:**

- а) серийное получение наркотических средств
- б) получение готовых к использованию и потреблению наркотических средств
- в) культивирование растительного сырья для дальнейшего изготовления наркотических средств
- г) изготовление психотропных препаратов

**51. Наиболее часто психозы развиваются при употреблении:**

- а) препаратов конопли
- б) опиатов
- в) ингалянтов
- г) бензодиазепинов

**52. Следы внутривенных инъекций обнаруживаются при употреблении:**

- а) барбитуратов
- б) галлюциногенов
- в) стимуляторов
- г) антипаркинсонических препаратов

**53. Максимальная толерантность к алкоголю развивается при алкоголизме:**

- а) в первой стадии заболевания
- б) во второй стадии заболевания
- в) в третьей стадии заболевания
- г) в состоянии алкогольной абстиненции

**54. Соматические изменения в III стадии алкоголизма:**

- а) отсутствуют
- б) носят характер функциональных нарушений
- в) носят необратимый характер
- г) носят характер вегетативных расстройств

**55. Ранним называется алкоголизм, формирующийся в период:**

- а) до 25 лет
- б) до 18 лет
- в) внутриутробного развития
- г) 6–7 лет

**56. Эфедрон чаще всего употребляется:**

- а) внутривенно
- б) внутримышечно
- в) путем курения
- г) путем ингаляции

**57. Алкогольная деградация личности проявляется:**

- а) ослаблением памяти и утратой критики
- б) разноплановостью мышления

- в) морально-этическим снижением
- г) эмоциональной амбивалентностью

**58. Для легкой степени алкогольного опьянения характерно:**

- а) нарушение поведения
- б) нарушение сознания и ориентировки
- в) нарушение походки
- г) тремор

**59. Осложненная наркомания – это сочетание зависимости от наркотиков и:**

- а) антибиотиков
- б) алкоголя
- в) глюкокортикоидов
- г) витаминных препаратов

**60. Какой из перечисленных методов является наиболее эффективным для преодоления анозогнозии:**

- а) гипноз
- б) медикаментозная терапия
- в) рациональная психотерапия
- г) иглорефлексотерапия

**61. Социальные последствия наркологических заболеваний проявляются в:**

- а) способности выполнять в полном объеме семейные и производственные обязанности
- б) выраженном профессиональном снижении с утратой прежней квалификации
- в) иждивенческих тенденциях
- г) деградации личности

**62. Клиническими проявлениями наркомании при употреблении препаратов стимулирующего ряда являются:**

- а) приподнятое настроение
- б) повышение работоспособности
- в) болтливость

г) острые бредовые состояния

**63. Токсикомания – это заболевание, обусловленное употреблением:**

а) химических токсических веществ

б) психотропных препаратов

в) алкоголя

г) наркотиков

**64. Для интоксикации опиоидными наркотиками характерно:**

а) бледность кожи

б) покраснение кожи

в) сужение зрачков

г) расширение зрачков

**65. Заключительный этап лечения больных алкоголизмом - это:**

а) поддерживающее медикаментозное и психотерапевтическое лечение

б) оздоровление микросоциального окружения

в) трудовая реабилитация

г) все ответы верны

**66. Алкоголь в организме в основном всасывается в:**

а) желудке

б) двенадцатиперстной кишке

в) толстом кишечнике

г) тощей кишке

**67. Основными признаками алкогольного параноида являются:**

а) галлюцинаторные расстройства

б) чувственный аффект страха

в) бред преследования

г) психические автоматизмы

**68. Расширение зрачков характерно для:**

а) эфедроновой интоксикации

- б) барбитуровой интоксикации
- в) опийного абстинентного синдрома
- г) опийной интоксикации

**69. Эпилептиформный синдром при алкоголизме наиболее часто проявляется в виде:**

- а) больших судорожных припадков
- б) эпилептического слабоумия
- в) дисфорических состояний
- г) сумеречного помрачения сознания

**70. Основными клиническими признаками «профессионального» делирия являются:**

- а) бред преследования
- б) стереотипные автоматизированные действия
- в) слуховые галлюцинации
- г) ложные узнавания

**71. Клиническими проявлениями наркомании при употреблении галлюциногенов являются:**

- а) зрительные галлюцинации
- б) страх, подозрительность
- в) бредовые идеи преследования
- г) параличи нижних конечностей

**72. Повторное медицинское освидетельствование проводится по:**

- а) личному заявлению водителя
- б) направлению руководителя автотранспортного предприятия
- в) направлению медицинского работника
- г) направлению сотрудников ГИБДД

**73. К метаболитам алкоголя относятся:**

- а) ацетальдегид
- б) молочная кислота
- в) уксусная кислота

г) масляная кислота

**74. Характерными признаками интоксикации при употреблении кетамина являются:**

- а) психомоторное возбуждение
- б) зрительные и слуховые галлюцинации
- в) нарушение речи
- г) потеря способности запоминать текущие события

**75. Для вынесения заключения о факте употребления наркотического вещества обязательным является:**

- а) заявление испытуемого об употреблении наркотического вещества
- б) обнаружение наркотического вещества в биологических средах организма
- в) представление врачу сведений об употреблении испытуемым наркотического вещества
- г) выявление клиники опьянения (одурманивания), вызванного употреблением наркотических веществ

**76. Для проведения лабораторных исследований биологических сред на содержание алкоголя используются:**

- а) алкометры
- б) газовые хроматографы
- в) метод Раппопорта
- г) тест-полоски

**77. Первый этап терапии больных алкоголизмом - это**

- а) клиническое обследование больного
- б) прерывание запоев и проведение дезинтоксикации
- в) купирование абстинентных расстройств
- г) все ответы верны

**78. Медицинские работники автотранспортных предприятий осуществляют:**

- а) контроль за состоянием здоровья водителей
- б) анализ причин отстранения водителей от работы
- в) участие в служебном расследовании дорожно-транспортных происшествий (ДТП)

г) проведение медицинских осмотров водителей

**79. Переход от эпизодического к систематическому злоупотреблению алкоголем проявляется в:**

а) учащении периодов опьянения

б) изменении характера опьянения

в) традиционно обусловленных эпизодах употребления алкоголя

г) росте толерантности к алкоголю

**80. Симптомы, характерные для употребления летучих органических соединений (бензин, толуол, бензол, ацетон и т.д.):**

а) сужение зрачков

б) тахикардия

в) нарушение координации движений

г) дезориентировка

**81. В неизменном виде алкоголь выводится из организма:**

а) печенью

б) легкими

в) почками

г) молочными железами

**82. Начальный этап лечения алкоголизма предусматривает:**

а) выработку условного рефлекса отвращения к алкоголю

б) прерывание злоупотребления алкоголем

в) устранение абстинентного синдрома

г) снижение признаков возбудимости

**83. Основные симптомы Корсаковского психоза:**

а) полиневриты

б) амнезия

в) конфабуляции

г) сохранность памяти



**84. Для второй стадии алкоголизма наиболее характерны следующие признаки:**

- а) физическая и психическая зависимость от алкоголя
- б) алкогольный абстинентный синдром
- в) высокая толерантность к алкоголю
- г) алкогольная деградация личности

**85. Алкоголизм – это хроническое заболевание, характеризующееся:**

- а) прогрессивным течением
- б) отсутствием патологического влечения к алкоголю
- в) формированием абстинентного синдрома
- г) развитием стойких соматических, неврологических расстройств и деградацией личности

**86. К синдромам помрачения сознания могут быть отнесены следующие:**

- а) оглушение
- б) делирий
- в) онейроид
- г) психоорганический синдром

**87. Для наркомании характерно:**

- а) развитие физической и психической зависимости от наркотиков
- б) рост толерантности к наркотическим веществам
- в) выраженные изменения личности
- г) отсутствие абстинентного синдрома

**88. Основными задачами предрейсовых медицинских осмотров являются выявление у водителей:**

- а) признаков употребления алкоголя
- б) признаков употребления наркотических средств
- в) наличие у водителей симптомов острого заболевания или обострения хронического заболевания
- г) признаков употребления сильнодействующих веществ

**89. Предрейсовые медицинские осмотры проводятся:**

- а) врачами
- б) фельдшерами
- в) медицинскими сестрами
- г) все ответы верны

**90. В кабинеты экспертизы опьянения после проведения предрейсового медицинского осмотра водители направляются в случаях:**

- а) противоречивости данных клинического и лабораторного исследования
- б) согласия водителя с заключением проведенного контроля трезвости
- в) неясной или неполной клинической картины опьянения
- г) сомнительных результатов лабораторного исследования

**91. В «группу риска» входят водители:**

- а) склонные к употреблению психоактивных веществ
- б) длительно и часто болеющие
- в) старше 40 лет
- г) старше 55 лет

**92. Для водителей «группы риска» проводятся медицинские осмотры:**

- а) предрейсовые
- б) текущие
- в) послерейсовые
- г) еженедельные

**93. К обороту наркотических средств относятся:**

- а) культивирование растений, содержащих наркотические вещества естественного происхождения
- б) производство и изготовление наркотических средств
- в) хранение, перевозка и пересылка наркотических средств
- г) пропаганда употребления наркотиков

**94. К основным принципам антиалкогольной терапии относятся:**

- а) непрерывность и длительность

- б) комплексность
- в) максимальная индивидуальность
- г) принудительность

**95. Клинические проявления алкогольного абстинентного синдрома:**

- а) тремор, потливость
- б) влечение к опохмелению
- в) сухость кожи
- г) повышение аппетита

**96. Наркомания - это заболевание, вызванное употреблением:**

- а) опиатов
- б) препаратов конопли
- в) препаратов стимулирующего действия
- г) сильнодействующих препаратов

**97. К клиническим проявлениям наркомании при употреблении препаратов конопли относят:**

- а) ощущение легкости движений
- б) психомоторное возбуждение
- в) расстройство сознания, бред, галлюцинации
- г) благодушие, расслабленность

**98. Основными симптомами алкогольного делирия являются:**

- а) аффективные расстройства
- б) зрительные и слуховые галлюцинации
- в) бред преследования
- г) зрительные и слуховые псевдогаллюцинации

**99. Основные симптомы энцефалопатии Гайе-Вернике:**

- а) нарушение сознания
- б) психотические расстройства
- в) гиперкинезы

г) отсутствие неврологических расстройств

**100. При химико-токсикологических исследованиях для определения наркотических или сильнодействующих веществ в биологических средах организма используют:**

а) тест-полоски

б) газожидкостную и тонкослойную хроматографию

в) иммуноферментный анализ

г) алкометры

**101. Помещение для проведения предрейсовых медицинских осмотров должно иметь:**

а) мебель (кушетка медицинская, письменный стол, стол и т.д.)

б) электрокардиограф

в) приборы для определения алкоголя в биологических средах организма

г) тест-полоски

**102. Гарантированный объем помощи больным наркоманией включает:**

а) обследование

б) диагностику

в) стационарное лечение

г) санаторное лечение

**103. Отчетные формы наркологических учреждений и подразделений**

а) фф 1,30

б) фф 37,11

в) фф 36,10

г) фф 36,30

**104. Что нужно сделать при несчастном случае на производстве в ЛПУ (попадание биологической жидкости пациента через поврежденные кожные покровы – порез, прокол и т.д., на слизистые оболочки медработника):**

а) Оказать себе самопомощь, используя аптечку для профилактики ВИЧ-инфекции

б) Сообщить представителю администрации об аварии

в) Уточнить данные по ВИЧ-статусу пациента или обследовать его на антитела к ВИЧ экспрестестами с последующим обследованием через лабораторию

г) Сообщить родственникам пациента о факте аварии

**105. Пробы сыворотки, до момента доставки в лабораторию, могут храниться в ЛПУ (вакутейнеры без компонентов, стеклянные пробирки):**

а) до 1 суток при температуре +4 +8 градусов С

б) в течение 5 суток при температуре +4 +8градусов С

в) до 7 суток при температуре +4 +8 градусов С

г) несколько месяцев при температуре +4 +8 градусов С

**106. Показания к амбулаторному лечению больных алкоголизмом:**

а) начальная форма болезни

б) выраженная абстиненция

в) неотложное состояние

г) активное противоалкогольное лечение

**107. Действия медработника в случае попадания крови на слизистую носа:**

а) промыть 2% раствором марганцевого кислого калия

б) промыть слизистую 2 % р-ром протаргола

в) промыть слизистую большим количеством воды из под крана, или емкости в аптечке

г) промыть слизистую перекисью водорода

**108. К симптомам расстройства восприятия относятся:**

а) бред

б) иллюзии

в) эйфория

г) страхи

**109. Симптом расстройства эмоций:**

а) амнезия

б) кома

в) эйфория

г) оглушение

**110. Функция койки - это:**

- а) среднее число дней работы койки в году
- б) число больных лечившихся на койке за год
- в) число больных поступивших в стационар в данном году
- г) среднее число поступивших в стационар в данном году

**111. Больной наркоманией может быть снят с учета после лечения при условии воздержания от употребления наркотиков:**

- а) 1 год
- б) 5 лет
- в) 3 года
- г) 4 года

**112. Какой документ выдается при нетрудоспособности возникающей вследствие алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения:**

- а) справка
- б) лист нетрудоспособности не выдается
- в) справка на 3 дня, затем листок нетрудоспособности
- г) листок нетрудоспособности с отметкой о состоянии опьянения в истории болезни и в листке нетрудоспособности

**113. Понятие рецидив при алкогольной зависимости включает в себя все перечисленное, кроме:**

- а) возобновление алкоголизации вследствие актуализации первичного влечения к алкоголю
- б) употребление алкоголя не повлекшее за собой развитие болезненных симптомов
- в) употребление алкоголя с целью улучшения своего психического состояния
- г) возобновление алкоголизации вследствие кампульсивного влечения к алкоголю

**114. Из всех соматических осложнений при алкоголизме наиболее специфичными являются:**

- а) сосудистая гипертензия
- б) панкреатит
- в) жировая дистрофия печени
- г) гастрит

**115. В кабинете анонимного лечения:**

- а) на обратившегося документация не заводится
- б) документация заводится по усмотрению обратившегося
- в) заводится амбулаторная карта без указания фамилии и адреса обратившегося
- г) используются все формы регистрации

**116. Клинико-экспертная комиссия наркодиспансеров решает следующие задачи:**

- а) направление больных на медико-социальную экспертизу
- б) экспертизы алкогольного или наркотического опьянения;
- в) диагностики в сложных случаях.
- г) лечебно-диагностической работы

**117. Целью санитарно-просветительной работы в стационаре является:**

- а) формирование трезвеннической установки на период лечения;
- б) формирование установки на дозированное (контролируемое) потребление алкоголя;
- в) пропаганда здорового образа жизни;
- г) формирование установки на отказ от алкоголя навсегда.

**118. Динамику изготовления и потребления алкоголя в мире отражают данные:**

- а) ВОЗ о производстве алкоголя на душу населения в мире
- б) о потреблении алкоголя на душу населения в мире
- в) о потреблении алкоголя населением конкретного региона
- г) о потреблении алкоголя на душу населения в отдельном регионе

**119. Уголовная ответственность предусматривается кроме:**

- а) нарушение установленных правил производства, хранения, отпуска, перевозок наркотических лекарственных средств
- б) незаконное изготовление, сбыт, хранение наркотических средств
- в) употребление или приобретение ПАВ без врачебного предписания
- г) содержание притонов для потребления наркотиков, склонение несовершеннолетних к употреблению наркотических средств

**120. Современные тенденции, характерные для наркоманий, включают:**

- а) преимущественное употребление средств растительного происхождения;
- б) появление новых форм наркотиков;
- в) исключительно парентеральный путь введения;
- г) уменьшение числа женщин, злоупотребляющих наркотиками.

**121. К наркотическим препаратам относятся:**

- а) содержащие спирт
- б) галлюциногены
- в) препараты валерианы
- г) этанол

**122. При отравлении барбитуратами не наблюдается :**

- а) возбуждение
- б) депрессия дыхания
- в) снижение рефлексов
- г) артериальная гипотензия

**123. Характеристика термина "наркотическое средство" включает следующие критерии:**

- а) медицинский
- б) социальный
- в) юридический
- г) все перечисленные

**124. Заключительный этап лечения больных алкоголизмом - это:**

- а) восстановительная терапия
- б) поддерживающее медикаментозное и психотерапевтическое лечение
- в) оздоровление микросоциального окружения
- г) все перечисленные

**125. Соматическое состояние больных алкоголизмом чаще представлено:**

- а) жировой дистрофией печени, гепатитами, циррозами
- б) панкреатитами, гастритами



- в) кардиомиопатиями
- г) всем перечисленным

**126. Из всех неврологических нарушений при алкоголизме наиболее специфическими являются:**

- а) синдром рассеянного энцефаломиелита
- б) полиневропатия
- в) гипоталамический синдром с вегетативно-сосудистыми пароксизмами
- г) мононевриты

**127. Сроки пребывания больного в стационаре зависят:**

- а) от тяжести абстинентных расстройств
- б) от глубины и тяжести соматических неврологических и психопатологических
- в) от длительности и тяжести заболевания
- г) от всего перечисленного

**128. Поддерживающая терапия больных алкоголизмом включает в себя:**

- а) проведение реабилитационных мероприятий
- б) терапию соматических и неврологических нарушений
- в) длительную индивидуальную психотерапию
- г) все перечисленное

**129. Мероприятия вторичной профилактики специалисты наркологической службы проводят:**

- а) амбулаторно
- б) стационарно
- в) консультативно
- г) в рамках социологического опроса

**130. Основными причинами рецидивов у женщин являются:**

- а) анозогнозия и отсутствие установок на лечение
- б) неблагоприятное микросоциальное окружение
- в) актуализация влечения к алкоголю

г) все перечисленное

**131. Наиболее значимым фактором в проведении лечебно-реабилитационных мероприятий у подростков, страдающих алкоголизмом, является**

- а) индивидуальная психотерапия
- б) оздоровление микросоциального окружения
- в) назначение психотропных средств
- г) стационарирование

**132. Из существующих скрининговых методов наиболее доступным является проведение:**

- а) аналитическое тестирование
- б) психологическое тестирование
- в) профилактическое тестирование
- г) социологическое тестирование

**133. Для III стадии алкоголизма характерны, кроме:**

- а) повышенная толерантности к алкоголю
- б) истине запои
- в) алкогольная деградация личности
- г) бродяжничество

**134. Факторы, способствующие развитию наркологических заболеваний у подростков:**

- а) стремление к самоутверждению
- б) склонность к подражанию
- в) отсутствие социальных жизненных интересов
- г) все верно

**135. К мероприятиям первичной профилктике относят:**

- а) индивидуальное консультирование

- б) психодиагностическое тестирование
- в) семейное консультирование
- г) раннее выявление потребления ПАВ

**136. Факторы положительно влияющие на эффективность лечения:**

- а) установка на лечение
- б) благоприятный психологический климат в семье
- в) начало лечения на ранней стадии болезни
- г) все верно

**137. Симптомами I стадии алкоголизма являются:**

- а) компульсивное влечение к алкоголю
- б) повышение толерантности
- в) утрата ситуационного контроля
- г) псевдозапой

**138. К субъектам медицинской профилактики не относят:**

- а) консультативные центры
- б) органы здравоохранения
- в) органы образования
- г) органы по делам семьи и молодёжи

**139. Симптомами II стадии алкоголизма являются:**

- а) обсессивное влечение к алкоголю
- б) абстинентный синдром
- в) утрата защитного рвотного рефлекса
- г) утрата ситуационного контроля

**140. К вербальным средствам общения относится:**

- а) поза
- б) речь
- в) взгляд

г) жест

**141. Медицинская профилактика наркологических заболеваний, реализуемых через системы, кроме:**

а) внутриведомственного взаимодействия

б) клинической психологии

в) межведомственного взаимодействия

г) наркологической службы

**142. Первичная профилактика охватывает:**

а) все группы населения

б) несовершеннолетних

в) только молодых людей

г) все ответы верны

**143. Какой из перечисленных методов является наиболее эффективным для преодоления анозогнозии:**

а) гипноз

б) медикаментозная терапия

в) рациональная психотерапия

г) иглорефлексотерапия

**144. К основным критериям, определяющим состояние простого алкогольного опьянения, относятся все перечисленные, кроме**

а) изменения в эмоциональной сфере

б) миоза

в) запаха алкоголя изо рта

г) функциональных изменений моторики

**145. Изменения личности при алкоголизме обусловлены:**

а) токсическим действием алкоголя и его метаболитов

б) характерологическими особенностями индивидуума

в) всем перечисленным

г) психореактивными моментами

**146. Для алкогольной деградации характерно:**

- а) эмоциональное огрубление с исчезновением семейных и общественных при-
- б) упадок инициативы и работоспособности с невозможностью систематически
- в) утрата морально-нравственных ценностей
- г) все перечисленное

**147. Алкогольная кардиомиопатия проявляется:**

- а) нарушениями ритма сердца
- б) недостаточностью сократительной функции миокарда
- в) разнообразными болевыми ощущениями в области сердца
- г) всем перечисленным

**148. При лечении алкоголизма используются все методы психотерапии, кроме:**

- а) индивидуальной рациональной психотерапии
- б) гипнотерапии
- в) эмоционально-стрессовой психотерапии
- г) наркогипнотерапии

**149. Современное состояние проблемы наркоманий отражает:**

- а) увеличение числа больных среди молодежи и женщин
- б) изменение мотивов потребления наркотиков - для удовлетворения любопытства
- в) ответ 1,2
- г) ответ 1

**150. В настоящее время для наркоманий характерны все перечисленные тенденции, исключая:**

- а) преимущественное употребление средств растительного происхождения
- б) появление новых форм наркотиков
- в) рост числа женщин, злоупотребляющих наркотиками
- г) склонность к комбинированному приему наркотиков

**151. К классу веществ, способных вызывать зависимость, относят все перечисленные, кроме:**

- а) группы амфетамина и других психостимуляторов
- б) веществ гипнотического и седативного действия
- в) галлюциногенных веществ
- г) нейролептических средств

**152. Из перечисленных факторов в группу высокого риска формирования наркоманий у подростков относят все, исключая:**

- а) социально-неблагополучные семьи
- б) алкоголизм, наркомании у родителей, ближайших родственников
- в) патологические формы поведения
- г) наличие хронических соматических заболеваний

**153. Реабилитация больных наркоманией предусматривает:**

- а) организацию условий для полноценного комплексного поддерживающего лечения больных
- б) психологический тренинг
- в) социальную помощь
- г) все перечисленное

**154. Решение о прекращении диспансерного наблюдения принимает врачебная комиссия в следующих случаях:**

- а) подтвержденной стойкой ремиссии не менее трех лет
- б) подтвержденной стойкой ремиссии не менее пяти лет
- в) подтвержденной стойкой ремиссии не менее четырех лет
- г) подтвержденной стойкой ремиссии более пяти лет

**155. Диспансерный осмотр врачом-психиатром-наркологом (врачом-психиатром-наркологом участковым) включает:**

- а) оценка состояния пациента, сбор жалоб и анамнеза, физикальное обследование
- б) подтверждение ремиссии
- в) проведение краткого профилактического консультирования
- г) все ответы верны

**156. Врач-психиатр-нарколог (врач-психиатр-нарколог участковый) при проведении диспансерного наблюдения:**

- а) ведет статистический учет пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением
- б) все ответы верны
- в) организует и осуществляет проведение диспансерных приемов
- г) информирует пациентов о порядке, объеме, сроках и периодичности диспансерного наблюдения

**157. В ходе диспансерного наблюдения проводится углубленный медицинский осмотр, включающий в себя:**

- а) определение наличия психоактивных веществ в моче
- б) психологическое тестирование
- в) консультация психотерапевта
- г) определение наличия психоактивных веществ в крови

**158. Как часто проводится углубленный медицинский осмотр в рамках диспансерного наблюдения:**

- а) ежемесячно
- б) один раз в год
- в) один раз в шесть месяцев
- г) не реже одного раза в три месяца

**159. Осмотр врачом-психиатром-наркологом находящихся в ремиссии свыше 2 лет осуществляется:**

- а) не реже одного раза в три месяца
- б) не реже одного раза в шесть месяцев
- в) не чаще одного раза в четыре месяца
- г) не реже одного раза в год

**160. Осмотр врачом-психиатром-наркологом находящихся в ремиссии от 1 до 2 лет осуществляется:**

- а) не чаще одного раза в шесть недель
- б) не реже одного раза в шесть недель
- в) не чаще одного раза в год

г) не реже одного раза в три недели

**161. Осмотр врачом-психиатром-наркологом в течение первого года ремиссии осуществляется:**

а) не реже одного раза в месяц

б) не реже одного раза в шесть недель

в) не реже одного раза в три месяца

г) не реже одного раза в в шесть месяцев

**162. Порядок оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология" осуществляется на основании:**

а) приказа от 30 декабря 2015 года N 1034н

б) приказа от 15 ноября 2012 года N 928н

в) приказа от 15 ноября 2012 г. N 929н

г) приказа от 30 декабря 2015 года N 1043н

**163. Медицинская помощь по профилю "психиатрия-наркология" осуществляется в виде:**

а) первичной медико-санитарной помощи

б) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи

в) специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи

г) все ответы верны

**164. Медицинская помощь оказывается в следующих условиях**

а) вне медицинской организации

б) амбулаторно

в) все ответы верны

г) стационарно

**165. Профилактика наркологических расстройств обеспечивается путем:**

а) разработки и реализации программ профилактики наркологических расстройств

б) осуществления мероприятий по предупреждению и раннему выявлению наркологических расстройств

в) осуществления мероприятий по диспансерному наблюдению за лицами с наркологическими расстройствами



г) все ответы верны

**166. Профилактика наркологических расстройств включает комплекс следующих мероприятий, кроме:**

- а) проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению
- б) выявление риска развития наркологических расстройств
- в) оказание медицинских услуг по профилактике наркологических расстройств
- г) проведение реабилитационных мероприятий

**167. Первичная медико-санитарная помощь не включает:**

- а) первичную врачебную медико-санитарную помощь
- б) первичную специализированную медико-санитарную помощь
- в) специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях
- г) первичную доврачебную медико-санитарную помощь

**168. Порядок проведения предменструальных, предменструальных и послеменструальных, послеменструальных медицинских осмотров проводится на основании приказа:**

- а) от 15 декабря 2014 № 835н
- б) от 15 декабря 2014 г. N 834н
- в) от 16 апреля 2012 г. N 366н
- г) от 14 июля 2003 г. N 308

**169. Предменструальные, предменструальные медицинские осмотры проводятся в целях выявления:**

- а) признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов
- б) состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей
- в) признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения
- г) все ответы верны

**170. Предменструальные, предменструальные и послеменструальные, послеменструальные медицинские осмотры проводятся медицинскими работниками:**

- а) имеющими высшее образование
- б) имеющими среднее профессиональное образование
- в) прошедшие программу подготовки по вопросам проведения предменструальных,

послерейсовых медицинских осмотров

г) все ответы верны

**171. В случае регистрации у работника отклонения величины артериального давления или частоты пульса проводится повторное исследование:**

а) не более двух раз с интервалом не менее 15 минут

б) не более двух раз с интервалом не менее 10 минут

в) не более двух раз с интервалом не менее 20 минут

г) не более двух раз с интервалом не менее 25 минут

**172. Эпидемиологические исследования проблемы алкоголизма свидетельствуют о росте заболевания среди всех перечисленных категорий населения, исключая**

а) женщин

б) безработных

в) детей

г) подростков, юношей

**173. Социальный аспект проблемы распространения алкоголизма и наркоманий в мире в настоящее время определяется:**

а) растущим организованным бизнесом

б) нравственной деформацией, интеллектуальной отсталостью

в) все ответы верны

г) низкой культурой населения

**174. В случае отказа освидетельствуемого от выполнения тех или иных инструкций или от лабораторных исследований необходимо:**

а) убедить его в целесообразности и необходимости прохождения экспертизы

б) заполнить все пункты протокола с пометкой об отказе

в) отказать в проведении экспертизы

г) госпитализировать его для проведения соответствующего обследования

**175. Функциональные обязанности участкового врача психиатра-нарколога предполагают:**

- а) организацию и проведение лечебно-диагностической работы
- б) ведение регистрационной, учетной и отчетной документации
- в) организацию и проведение санитарно-просветительной работы
- г) все ответы верны

**176. В легких случаях деперсонализации отмечается:**

- а) ощущение внутренней измененности, касающейся чувств и мыслей
- б) ощущение измененности окружающего мира
- в) снижение полноты восприятия окружающего мира
- г) все ответы верны

**177. Алкоголизм - это хроническое заболевание, характеризующееся:**

- а) прогрессивным течением
- б) формированием патологического влечения к алкоголю
- в) формированием состояния отмены при прекращении употребления алкоголя
- г) верно все перечисленное

**178. Для цирроза печени алкогольного генеза характерно:**

- а) тупая боль в правом верхнем квадранте живота
- б) горечь во рту
- в) увеличение и плотность печени
- г) все ответы верны

**179. Легкая степень острой алкогольной интоксикации характеризуется:**

- а) ощущением психического и физического комфорта
- б) повышением речедвигательной активности
- в) легким нарушением координации движений
- г) все ответы верны

**180. В задачи стационарных наркологических отделений входит, кроме:**

- а) оказания специализированной лечебно-диагностической помощи
- б) купирования психозов, связанных с потреблением психоактивных веществ
- в) проведения наркологической экспертизы

г) диспансерного наблюдения

**181. Факторами риска возможного потребления ПАВ являются:**

а) отягощенная наследственность алкоголизмом, наркоманиями, психическими заболеваниями

б) характерологические отклонения с девиантным поведением

в) доступность ПАВ

г) все ответы верны

**182. Какой признак наиболее важен для установления диагноза наркомания?**

а) Патологическое влечение к наркотику

б) Изменение картины опьянения

в) Активный поиск наркотика

г) нет правильного ответа

**183. Санитарно-гигиеническая работа по профилактике табакокурения проводится в отношении:**

а) детей и подростков

б) лиц употребляющих табак

в) всего населения

г) все ответы верны

**184. Деонтология - это наука:**

а) о долге врача и среднего медицинского персонала

б) создать благоприятную обстановку для выздоровления больного

в) установить доверительные отношения

г) все ответы верны

**185. Освидетельствование для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения может осуществляться:**

а) врачом психиатром-наркологом наркодиспансера

б) врачом скорой помощи

в) инспектором ГИБДД (ГАИ)

г) любым дежурным врачом больницы

**186. Для купирования состояния отмены (алкогольного абстинентного синдрома) обычно используются:**

- а) витаминные препараты
- б) ноотропы
- в) транквилизаторы
- г) все ответы верны

**187. Объектом санитарно-гигиенического воспитания являются:**

- а) педагоги, преподаватели высших и средних специальных заведений
- б) работники юстиции, прокуратуры, милиции
- в) родители, родственники больных
- г) все ответы верны

**188. При опросе подростков, страдающих зависимостью от ПАВ, приемлемо:**

- а) общение в форме непринужденной беседы
- б) обсуждение тем, интересующих подростка
- в) отсутствие видимой схемы опроса
- г) все ответы верны

**189. В задачи наркологического диспансера входит:**

- а) лечебно-консультативная работа
- б) осуществление профилактических мероприятий
- в) выполнение диагностической, лечебно-реабилитационной деятельности
- г) все ответы верны

**190. К показателям, характеризующим деятельность поликлиники, относятся:**

- а) процесс охвата диспансерным наблюдением
- б) число лиц, снятых с диспансерного учета
- в) выполнение принципа участковости
- г) все ответы верны

**191. Документами для составления годового отчета о деятельности поликлиники являются:**

- а) контрольная карта диспансерного наблюдения больного
- б) листок учета больных и коечного фонда
- в) карта выбывшего из стационара
- г) все ответы верны

**192. Наиболее значимым фактором в проведении лечебно-реабилитационных мероприятий у подростков, страдающих алкоголизмом, является:**

- а) индивидуальная психотерапия
- б) назначение психотропных средств
- в) оздоровление микросоциального окружения
- г) назначение сенсibiliзирующих средств

**193. В основе врачебной этики и деонтологии лежат все перечисленные критерии, кроме:**

- а) гуманизма
- б) рационализма
- в) профессионализма
- г) индивидуального подхода

**194. Основу санитарной статистики составляют такие понятия как:**

- а) заболеваемость
- б) болезненность
- в) смертность
- г) все ответы верны

**195. К экономическим последствиям алкоголизма относятся все перечисленные, кроме**

- а) большого числа дней нетрудоспособности
- б) совершения автоаварий в нетрезвом виде
- в) выплат по социальному страхованию
- г) оказания помощи в лечебных учреждениях

**196. К факторам, влияющим на развитие алкоголизма, относятся:**

- а) социально-средовые

- б) личностные
- в) биологические
- г) все ответы верны

**197. Характер и объем профилактической работы врача психиатра-нарколога регламентируется следующими нормативными актами:**

- а) приказама Минздрава РФ
- б) Федеральными законами
- в) указами, постановлениями Президента, правительства РФ
- г) все ответы верны

**198. Укажите шифр по МКБ-10 психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением каннабиноидов:**

- а) F 10
- б) F 11
- в) F 12
- г) F 18

**199. Уголовная ответственность не предусматривается при:**

- а) Хищении наркотических лекарственных средств
- б) Незаконном изготовлении, сбыт, хранение наркотических средств
- в) Потреблении или приобретении ПАВ, выписанные психиатром-наркологом
- г) Содержании притонов для потребления наркотиков

**200. Укажите шифр по МКБ-10 психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением алкоголя:**

- а) F 10
- б) F 12
- в) F 13
- г) F 15

**201. Клинический диагноз ВИЧ – инфекции может быть установлен на основании:**

- а) клинической картины течения, эпидемиологического анамнеза, данных лабораторного исследования

- б) по наличию антител к ВИЧ|
- в) по наличию туберкулеза у ВИЧ – инфицированного
- г) по наличию длительной лихорадки неясной этиологии

**202. Регламентирующие документы, определяющие работу МО по ВИЧ/СПИД**

- а) Федеральный закон РФ от 30.03.1995г. № 38-ФЗ
- б) Санитарные правила СП 3.1.5.2826-10 от 11.01.2011 с изменениями от 21.07.2016 № 95
- в) Приказ МЗ РФ от 09.01.2018г. № 1н
- г) Всё перечисленное верно

**203. Коды для направлений при обследовании на антитела к ВИЧ контингентов, подлежащих обязательному освидетельствованию:**

- а) 102, 104, 108
- б) 108, 118, 115
- в) 111, 115, 200
- г) верны ответы 2,3

**204. Укажите биологический материал, который используется для определения наличия антител к ВИЧ:**

- а) сыворотка крови, замороженная сыворотка крови
- б) кровь
- в) любая биологическая жидкость человека
- г) верны ответы 2, 3

**205. Коды для направлений при обследовании на антитела к ВИЧ контингентов, подлежащих добровольному освидетельствованию:**

- а) 101, 102, 105, 109, 112, 114, 116, 117
- б) 101, 108, 111, 119, 120, 122, 124, 127
- в) 103, 104, 110, 118, 121, 124, 125, 127
- г) верны ответы 1, 3

**206. После возникновения аварийной ситуации медицинский работник должен сделать запись:**

- а) в журнале учёта проведения профилактических прививок



- б) в журнале учета несчастных случаев на производстве
- в) в процедурном журнале учёта выполненных манипуляций
- г) в журнале учёта аварийных ситуаций при проведении медицинских манипуляций

**207. Действия медработника при загрязнении халата кровью:**

- а) снять халат и сдать в стирку
- б) снять халат, свернуть загрязнённой стороной в внутрь, замочить в дез. растворе, выдержать экспозицию, сдать в стирку, кожу под халатом обработать 70% этиловым спиртом
- в) снять халат, кожу под халатом обработать 70% этиловым спиртом, халат отдать для автоклавирования
- г) верны ответы б, в

**208. Перечислите ко-факторы для заражения ВИЧ – инфекцией:**

- а) анальный секс, гомо - бисексуальные контакты, частая смена сексуальных партнеров, травмирование слизистой и кожи половых органов при половых контактах
- б) наличие ИППП, половые контакты с лицом, употребляющим в/в наркотические препараты, психостимуляторы
- в) петтинг
- г) верны ответы а, б

**209. Документальное оформление аварийной ситуации**

- а) Сообщить об аварии руководителю подразделения, старшей медсестре, дежурному врачу. Случай аварии зарегистрировать в «Журнале учета аварийных ситуаций при проведении медицинских манипуляций»
- б) Составить акт о медицинской аварии в медицинской организации в 3-х экземплярах. Организовать эпидемиологическое расследование
- в) Составить акт о несчастном случае на производстве. Взять расписку с больного о том, когда он был последний раз обследован на наличие антител к ВИЧ
- г) Верны ответы а, б

**210. Как можно назвать состояние распространенности ВИЧ – инфекции в мире:**

- а) Эпидемия
- б) Спорадическая заболеваемость
- в) Пандемия

г) Вспышка

**211. Методы профилактики ВИЧ - инфекции:**

а) Проведение санитарно-просветительной работы, строгое соблюдение санитарно - противоэпидемического режима

б) Обязательное обследование всех доноров крови, органов и тканей, проведение инвазивных процедур строго по показаниям, защищённый половой контакт

в) Ношение респиратора, витаминотерапия, своевременная диагностика, дезинфекция

г) Верны ответы а, б

**212. Универсальные меры профилактики инфицирования медицинских работников**

а) Не общаться с пациентами, гигиена рук медработников

б) Каждого пациента условно считать как ВИЧ - инфицированного, соблюдать технику безопасности при работе с острым инструментарием, использовать СИЗ

в) Наличие укладки для профилактики парентеральных инфекций, ведение журнала учёта аварийных ситуаций при проведении медицинских манипуляций, регулярное профилактическое обследование

г) Верны ответы б, в

**213. Клинические показания для обследования на ВИЧ – инфекцию:**

а) Лихорадка более 1 месяца, диарея более 1 месяца, увеличение лимфоузлов двух и более групп

б) Психические заболевания, неукротимая рвота, кашель более 3 недель, частые ОРВИ

в) Необъяснимая потеря массы тела более чем на 10%, затяжные рецидивирующие пневмонии, пиодермии, подострый энцефалит и др.

г) Верны ответы а, в

**214. Показания к обследованию на ВИЧ - инфекцию (с подозрением или подтверждённым диагнозом и СПИД - индикаторными заболеваниями):**

а) рак лёгких, токсикомания, лейкемия, неврит зрительного нерва

б) наркомания, ЗППП, лимфома мозга, саркома Капоши, герпес

в) лейкоз, гепатит, туберкулёз, ЦМВ- инфекция, опоясывающий лишай

г) верны ответы б, в

**215. При попадании биологической жидкости на кожные покровы:**

а) промыть участок кожи с мылом под проточной водой затем обработать 70% этиловым

спиртом

б) промыть участок кожи с мылом под проточной водой затем обработать 3% перекисью водорода

в) промыть участок кожи с мылом под проточной водой затем обработать 5% спиртовым раствором йода

г) обработать место контакта 70% этиловым спиртом, затем обмыть водой с мылом, повторно обработать 70% этиловым спиртом

**216. Для уменьшения риска заражения при обслуживании ВИЧ - инфицированного пациента перед надеванием перчаток рекомендовано кожу ногтевых фаланг обработать:**

а) 70% этиловым спиртом

б) 95% этиловым спиртом

в) 3% перекисью водорода

г) 5% спиртовым раствором йода

**217. Повторные исследования на наличие антител к ВИЧ после аварийной ситуации проводятся:**

а) через 3, 6, 9, 12 месяцев

б) через 1 месяц, затем через 2 недели

в) через 3 суток, затем через 1 месяц

г) не обследуются

**218. Характеристика вируса ВИЧ:**

а) стоек во внешней среде, уничтожается любым дезинфицирующим раствором

б) не стоек во внешней среде, погибает при температуре 56 градусов через 30 минут, погибает при кипячении через 2-3 минуты

в) под действием дезинфекционных средств, работающих по вирусному типу, погибает мгновенно

г) верен ответ б, в

**219. Пробы сыворотки крови, до момента доставки в лабораторию, могут храниться в МО:**

а) до 1 суток при температуре +4 +8 градусов С

б) в течение 5 суток при температуре +4 +8градусов С

в) до 7 суток при температуре +4 +8 градусов С, до 1 месяца в случае замораживания и

отметки об этом на направлении

г) несколько месяцев при температуре +4 +8 градусов С

**220. Выберите что указывается в направлении при анонимном обследовании потребителя психоактивных веществ (инъекционно):**

а) вместо ФИО - буквенный или цифровой код, год рождения, пол, населённый пункт, код 102/127

б) ФИО, адрес проживания; код 103/120.

в) ФИО, дата рождения код 103/118

г) ФИО